

复旦大学附属肿瘤医院 手术知情同意书

姓 [REDACTED] 年龄: 39 病区: [REDACTED]

代理人姓名:

与患者关系:

1、患者疾病诊断: 直肠癌 (距肛6cm, T2N0, MRF-, EMVI-), 胃癌术后化疗后, 鼻咽癌放化疗后

2、手术适应症: 直肠癌 (距肛6cm, T2N0, MRF-, EMVI-), 胃癌术后化疗后, 鼻咽癌放化疗后

3、拟定手术: 直肠前切除备预防性造瘘术各直肠Hartmann术 (备肛门改道)

性质: 根治性

手术入路: 开放

4、拟定麻醉方式: 全麻

5、手术风险及并发症:

麻醉意外, 药物过敏反应

术中术后出血、凝血机制障碍、失血性休克

肿瘤不能切除

肿瘤累及重要脏器, 剥离造成损伤

重要血管损伤、神经损伤、输尿管损伤、后尿道损伤

术中根据病人情况改变麻醉方式或手术方式, 包括联合脏器切除、永久性或临时性结/回肠造瘘等

术后感染 (包括切口感染、尿路感染、肺部感染、急性腹膜炎等), 败血症

吻合口瘘、吻合口狭窄、直肠阴道瘘、直肠膀胱瘘、乳糜漏

肠粘连, 肠梗阻

切口疝, 切口裂开, 造口并发症 (包括出血感染、造口旁疝、造口坏死/回缩/狭窄、脱垂等)

脑血管意外, 心、肺、肝、肾等脏器的并发症及功能衰竭

其他不可预测的情况或手术意外导致的严重并发症或死亡

手术造成的暂时或永久的功能损害或丧失, 包括肛门控便功能异常或丧失, 排尿功能异常、性功能异常

术前多次活检病理不能明确为恶性, 应家属要求施行根治性手术。

恶性肿瘤复发转移

腹腔镜中转开放可能

下肢深静脉血栓形成可能, 继发其他部位栓塞, 严重者致死可能其他

6、替代医疗方案: 化疗或放化疗等其他内科治疗;

对上述手术风险及并发症, 如患者或代理人不理解可以向医师咨询, 在患者或代理人充分理解以后, 自

复旦大学附属肿瘤医院

姓名:

主决定是否选择手术治疗或按替代医疗方案实施。请在本文书上写明意见并签名。

患方选择意见: 手术

患者(代理人)签

签名者身份证号:

谈话医师签名: 

