

NA 首都医科大学附属北京妇产医院

分娩镇痛麻醉知情同意书

姓名: [redacted] 性别: 女 年龄: 28 岁 床号: [redacted] 住院号: [redacted]
诊断: 2/0, G38W, 头盆、胎位 正常 产程进展 顺利 无并发症
镇痛方式: ☒ 椎管内分娩镇痛 (☒ 腰-硬联合阻滞 ☐ 硬膜外阻滞 ☐ 连续腰麻)
☐ 静脉分娩镇痛

分娩镇痛是减轻产妇产宫收缩痛的一种镇痛方式,并不是完全无痛。产妇产程中神智清楚,可主动参与分娩过程,椎管内镇痛是目前国内外分娩镇痛效果最确切成熟的镇痛方法。如果产妇不适合椎管内分娩镇痛还可以选择静脉分娩镇痛。

分娩镇痛中可能发生的不良反应和意外:

1. 对麻醉药物过敏,局麻药毒性反应,高敏反应。
2. 心脑血管意外:心律失常,急性心肌梗塞,心力衰竭,心脏骤停;脑栓塞,脑出血,脑水肿。
3. 呼吸系统意外:恶心、呕吐、反流、气道梗阻、呼吸抑制、呼吸衰竭。
4. 体位改变可能导致仰卧位低血压综合征。
5. 腰背痛、头痛、尿潴留、感染、神经根及脊髓损伤,硬膜外血肿、导管折断、广泛阻滞、产后下肢局部有麻木感。
6. 静脉分娩镇痛可能导致产妇困倦、嗜睡、呼吸抑制等。
7. 由于产妇痛阈不同,部分产妇疼痛感觉减轻不明显。
8. 其他。

如对上述可能发生的麻醉意外及并发症表示理解请签字。

产妇签字: [redacted]

家属签字: [redacted]

麻醉医生: 曾凡

日期: 2017 年 9 月 10 日