

增强协议书

- 1、增强CT检查需要注射造影剂，心、肝、肾功能不全者，急性胰腺炎、骨髓瘤等患者慎做该项检查。
- 2、有碘过敏史者禁用，糖尿病患者若肾功能异常服用二甲双胍后需停药48小时后做该项检查。
- 3、我科采用的造影剂均由国家鉴定，应用造影剂会产生各种不良反应，故增强检查患者需家属陪同。
- 4、过敏体质患者应在检查前告知医师，有极少数患者可能会发生各类型过敏反应，最严重会因过敏性休克导致死亡。
- 5、各种心律不齐、心率过快可能会影响心脏冠状动脉检查质量，甚至检查失败。
- 6、注射部位可能会发生造影剂的外渗、疱疹、破溃、感染、产生疼痛和肿胀等。
- 7、增强CT检查有一定的X射线辐射，孕妇、育龄妇女、儿童进行检查前须告知检查医师。
- 8、对听力差、行为能力弱、语言交流有障碍者，需要家属配合检查。
- 9、对病情较重的患者，MSCT检查存在一定的风险，如急性心肌梗死、肺栓塞和主动脉夹层等。
- 10、增强检查结束后，请您在候诊大厅留观半个小时，如有不适请及时通知医护人员。

身高: 60.5kg 体重: 170cm

联系电话: [REDACTED]

同意增强请签字: 郑少峰

郑州大学第一附属医院放射科CT室