

恩泽医院药品超说明书用药知情同意书

患者姓名:	██████	性别:	男	年龄:	28 岁
所在科室:	泌尿外科	门诊号:	██████		
告知时间:	2019 年 11 月 22 日 10 时 10 分				
告知地点:	泌尿外科 14A				
临床诊断:	腺性膀胱炎				
拟超说明书用药药品名称:	塞来昔布胶囊 (西乐葆)				
拟超说明书用药类型:	<input type="checkbox"/> 改变给药剂量 <input type="checkbox"/> 改变适应人群 <input checked="" type="checkbox"/> 改变适应症 <input type="checkbox"/> 改变给药途径 <input type="checkbox"/> 其他				
<p>为实现患者健康利益最大化, 现针对患者病情, 建议“超说明书用药”。为此, 特告知如下事项:</p> <ol style="list-style-type: none">根据您的病情, 目前临床药物常规使用并不理想。在充分考虑药品不良反应、禁忌症、注意事项等, 按照有利患者健康, 知情同意等原则, 我们认为, 超说明书使用该药品是您目前最佳的诊疗方案。您有权要求医师、药师用通俗的语言对本知情同意书所载内容进行讲解, 在医师讲解后, 您有权向期提问并得到客观、科学的回答。为促进医学事业发展, 您的资料可能会被用于医学科研目的或临床研究。我们会对您的个人信息严格保密; 如您不同意, 在整个治疗过程中您随时可以提出, 告知主管医师, 不会影响我们对您的治疗。超说明书使用该药品可能发生如下不良反复, 包括但不限于:<ol style="list-style-type: none">塞来昔布与其它 NSAIDs 一样, 可能引起严重的心血管副作用, 例如心肌梗死或卒中, 这些副作用可能导致住院甚至死亡。虽然严重心血管事件的发生可能没有任何征兆, 但是患者应该警惕诸如胸痛、气短、无力、言语含糊等症状和体征, 而且当有任何上述症状或体征发生后应该马上寻求医生帮助。塞来昔布与其它 NSAIDs 一样, 可能引起胃肠道不适, 罕见而更严重的副作用如溃疡和出血, 可能导致住院甚至死亡。虽然严重的胃肠道溃疡和出血的发生可能没有任何征兆, 但是患者应警惕溃疡和出血的症状和体征, 在发现任何预示这些疾病的症状和体征包括腹上部疼痛、消化不良、黑便和呕血时, 应寻求医疗帮助。如果出现任何类型的皮疹, 应立即停药, 并尽快与医生联系。塞来昔布是一种磺胺类药物, 可能引起导					

致住院甚至死亡的严重的皮肤副作用,例如剥脱性皮炎、StevensJohnson 综合征和中毒性表皮坏死溶解症(TENS)。

所有的、甚至是非磺胺类非甾体抗炎药都可能发生这些反应。虽然严重的皮肤反应的发生可能没有征兆,但是

患者应警惕皮疹和水疱的症状和体征、发热或过敏反应的其他体征如瘙痒,在发现任何征兆的症状或体征时,

应寻求医疗帮助。既往有磺胺过敏史的患者不应服用塞来昔布。

4.患者应迅速向医生报告无法解释的体重增加或水肿的症状和体征。

5.应告知患者预示肝脏毒性反应的症状和体征(如:恶心、疲劳、嗜睡、瘙痒、黄疸、右上腹触痛和“感冒样”症状)。如发生这些症状和体征,应停止用药,并立即寻求治疗。

6.应告知患者过敏反应的症状和体征(如呼吸困难、颜面或喉部水肿)。如果发生这些症状或体征,应停止用药,并立即寻求治疗。

7.因为可能导致动脉导管提前闭合,在妊娠晚期应避免使用塞来昔布。

5. 如果发生医疗意外情况或上述不良反应,医生将按有关诊治常规积极救治病人,使您尽快地康复。

本人声明:医生已将上述内容明确告知,我已经充分理解上述情况,同意接受被告知药品的超说明书用药,并接受此种治疗可能发生的医疗风险。

被告知者签名(手印):

被告知者与患者关系:

参加告知医生签名: