



浙江省人民医院
ZHEJIANG PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL
杭州医学院附属人民医院
PEOPLE'S HOSPITAL OF HANGZHOU MEDICAL COLLEGE



姓名: 性别: 男 年龄: 35岁 病区: 日间医疗中心 床号: 15 住院号:

肝穿刺术告知书

1、简要病史:

2、目前诊断:

3、拟行操作方式: ☐肝穿刺活检术 ☐肝脓肿穿刺置管 ☐其他

4. 操作目的:

- (1) 明确肝病原因;
- (2) 明确肝病严重程度, 有助于确定下一步治疗方案;
- (3) 用于治疗前后对比, 有助于确定疗效;
- (4) 有针对性地穿刺有些特殊病变部位, 如肿瘤、囊肿、脓肿、血管瘤, 进行相应的诊断或治疗;

5. 肝穿刺过程中和术后可能出现的医疗风险:

- (1) 穿刺部位局部感染, 肝内感染, 腹腔内感染或败血症;
- (2) 局麻药过敏, 药物毒性反应;
- (3) 穿刺部位局部出血、血肿、渗血、渗液, 严重者发生大出血, 可能需要介入或外科手术止血, 甚至出现失血性休克, 可有生命危险;
- (4) 穿刺损伤局部神经;
- (5) 心血管症状: 穿刺期间可发生高血压、脑血管意外、心律失常、心包填塞、心肺呼吸骤停等;
- (6) 穿刺/置管失败;
- (7) 穿刺管折断、遗留在体内、堵塞等;
- (8) 肝脏破裂, 肿瘤针道转移;
- (9) 损伤胸腔其他脏器, 如肺、肾、脾、胰腺、胆囊、大血管等, 发生血胸、气胸、胆漏、肾脏及其他脏器损伤破裂等, 严重者需手术治疗;
- (10) 未能穿及并获取足够肝组织, 需重复穿刺;
- (11) 术后仍不能明确诊断;
- (12) 其他难以预料的并发症。

6. 肝穿刺过程中和术后可能出现的医疗风险防范措施:

- (1) 完善相关检查, 如血常规、凝血功能、血型等, 排除穿刺禁忌;
- (2) 针对性使用止血药物;
- (3) 穿刺过程在B超引导下完善, 尽可能避开其他脏器及血管;
- (4) 指导患者屏气训练, 配合医生操作;
- (5) 术后绝对卧床, 加压包扎, 密切监测生命体征;



浙江省人民医院
ZHEJIANG PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL
杭州医学院附属人民医院
PEOPLE'S HOSPITAL OF HANGZHOU MEDICAL COLLEGE



姓名: 性别: 男 年龄: 35岁 病区: 日间医疗中心 床号: 15 住院号:

(6) 穿刺后1月内避免剧烈活动、右手提重物、撞击胸腹部撞击等可能引起出血的行为。

7、替代方案:

拒绝行肝穿刺,可能导致无法明确诊断、影响下一步治疗;肝囊肿、脓肿、血管瘤等病变可能出现破裂、保守治疗效果不佳,导致病情加重等风险。

上述情况医生已与患者详细陈述,患者已完全理解,经慎重考虑后,我自愿要求行肝穿刺术。

患者(被授权人)签字

日期:

主管医师签字

日期: