

特殊治疗知情同意书

住院号

患者姓名: 性别: 女 年龄: 63岁 治疗日期: 2021年05月21日

临床诊断: 溃疡性结肠炎

治疗方法:

治疗目的:

糖皮质激素签字

患者因病史需要, 需使用糖皮质激素治疗, 但可能有以下风险:

- 1, 并发或加重感染
- 2, 易患结核或复发
- 3, 钠水潴留, 发生高血压。慢性肾功能不全者可加重浮肿, 心衰, 肾功能恶化
- 4, 骨质疏松, 自发性骨折, 无菌性股骨头坏死
- 5, 引起血糖升高或原有高血糖难于控制
- 6, 引起或加重消化性溃疡, 甚至诱发出血和穿孔
- 7, 可引起激动和失眠, 个别可诱发精神病
- 8, 痤疮、向心性肥胖, 满月脸等肾上腺皮质功能亢进症表现
- 9, 小儿长期应用可抑制生长发育
- 10, 长期应用可诱发白内障, 青光眼, 伤口愈合不良, 血栓, 栓塞, 月经失调等
- 11, 治疗无效

若同意治疗, 请签字:

生物制剂同意书

生物制剂同意书

生物制剂通过抑制炎症因子, 阻断机体免疫反应, 达到减轻组织损伤, 控制病情发展的作用, 是目前被证明为对病情严重或病程长的难治性自身免疫病有较好治疗效果的药物。但生物制剂在缓解病情抗风湿的同时, 还有可能有一定不良反应发生, 主要表现为:

1. 过敏反应: 如寒战发热、血管性水肿、荨麻疹等。重者甚至可能出现剥脱性皮炎、喉头水肿、过敏性休克等。
2. 胃肠道反应、肝肾功能异常等。
3. 头痛、眩晕等神经系统症状。
4. 加重心功能不全。
5. 可诱发或加重感染包括结核、真菌、细菌、病毒(含乙肝病毒等)等感染。
6. 可诱发免疫原性, 自身抗体产生。
7. 潜在恶性肿瘤风险, 长期监测未发现与恶性肿瘤自然发生率有明显差异。
8. 血液系统改变, 可出现白细胞、红细胞、血小板等下降。

根据中华人民共和国药典及近年来的临床经验, 在应用过程中大多数人无反应, 但由于个体差异, 少数人可有轻微反应, 极个别人可有严重反应, 甚至危及生命。医生已详细告知所用药物的各种毒副作用, 患方同意应用此类药物请签字。

交代医生签字

患者签字

医院意见

张莹



(必要时批示)

与患者关系: 子女

姓名:

年月日

上级医生签字

身份证号:



紧急

紧急原因

中国医科大学附属盛京医院

特殊治疗知情同意书

住院号

患者姓名:	性别: 男	年龄: 69岁	治疗日期: 2021年03月26日
临床诊断: 腹泻 便血 待查			
治疗方法:		治疗目的:	

糖皮质激素签字

患者因病史需要，需使用糖皮质激素治疗，但可能有以下风险：

- 1，并发或加重感染
- 2，易患结核或复发
- 3，钠水潴留，发生高血压。慢性肾功不全者可加重浮肿，心衰，肾功能恶化
- 4，骨质疏松，自发性骨折，无菌性股骨头坏死
- 5，引起血糖升高或原有高血糖难于控制
- 6，引起或加重消化性溃疡，甚至诱发出血和穿孔
- 7，可引起激动和失眠，个别可诱发精神病
- 8，痤疮、向心性肥胖，满月脸等肾上腺皮质功能亢进症表现
- 9，小儿长期应用可抑制生长发育
- 10，长期应用可诱发白内障，青光眼，伤口愈合不良，血栓，栓塞，月经失调等
- 11，治疗无效

若同意治疗，请签字：

生物制剂同意书

生物制剂同意书

生物制剂通过抑制炎症因子，阻断机体免疫反应，达到减轻组织损伤，控制病情发展的作用，是目前被证明为对病情严重或病程长的难治性自身免疫病有较好治疗效果的药物。但生物制剂在缓解病情抗风湿的同时，还有可能有一定不良反应发生，主要表现为：

- 1. 过敏反应：如寒战发热、血管性水肿、荨麻疹等。重者甚至可能出现剥脱性皮炎、喉头水肿、过敏性休克等。
- 2. 胃肠道反应、肝肾功能异常等。
- 3. 头痛、眩晕等神经系统症状。
- 4. 加重心功能不全。
- 5. 可诱发或加重感染包括结核、真菌、细菌、病毒（含乙肝病毒等）等感染。
- 6. 可诱发免疫原性，自身抗体产生。
- 7. 潜在恶性肿瘤风险，长期监测未发现与恶性肿瘤自然发生率有明显差异。
- 8. 血液系统改变，可出现白细胞、红细胞、血小板等下降。

根据中华人民共和国药典及近年来的临床经验，在应用过程中大多数人无反应，但由于个体差异，少数人可有轻微反应，极个别人可有严重反应，甚至危及生命。医生已详细告知所用药物的各种毒副作用，患方同意应用此类药物请签字。

交代医生签字	患者签字	医院意见
		(必要时批示)
上级医生签字	与患者关系: 夫妻	年月日
	姓名:	
	身份证号:	
	☐ 紧急	紧急原因