


发表病例报告知情同意书


尊敬的患者：

您好！经入院后相关检查，目前诊断考虑原发中枢神经系统 BCR-ABL 阳性的急性淋巴细胞白血病。此类病例国际上报道较少见，属于罕见病例，我们希望发表相关内容，增强医师对该类疾病的了解。发表的相关文章内容会隐去您的个人隐私，但会交代整个发病过程及治疗转归。若您同意，请签署此类知情同意书。

同意



医师：



日期：

2021.3.20

厦门大学附属中山医院

抗肿瘤治疗化疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 女 科别: 血液科病区 床号: [REDACTED] 住院号: [REDACTED]

目前患者诊断明确, 需进行全身化疗, 以达到的目的:

1. () 根治疾病, 达到治愈;
2. () 手术后巩固治疗, 防止复发;
3. (✓) 使肿瘤缩小, 为其他疗法创造条件使之延长生存;
4. () 姑息治疗, 减轻患者症状, 提高生存质量。

化疗方案:

大剂量甲氨蝶呤, 阿糖胞苷

治疗过程中可能出现以下毒副反应:

- () 胃肠道反应: 食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、口腔红斑、疼痛、溃疡、严重时出现伪膜性肠炎。
- () 肝肾功能损害: SGPT增高、黄疸指数增高、尿素氮增高、肌酐增高、血尿酸增高、出现蛋白尿、血尿。
- () 骨髓抑制: 白细胞下降、粒细胞减少、血小板减少、出血、鼻衄、紫斑、头晕、乏力、血红蛋白下降、红细胞减少。
- () 神经毒性: 嗜睡、头昏、听力下降、皮肤感觉异常、腱反射减退、肌肉疼痛、肢端麻木、腹胀、腹痛、便秘。
- () 心脏毒性: 心动过速、灶性心肌坏死、房性或室性心律失常、心功能不全、心包炎。
- () 脱发:
- () 局部反应: 红斑、干性脱皮、水疱、瘙痒、湿性皮炎、溃疡、严重时可产生、剥脱性皮炎、坏死、静脉炎、皮肤甲床变黑、皮疹。
- () 肺毒性: 导致肺间质纤维化、出现呼吸困难。
- () 低血压: 低速过快可出现血压下降。
- () 过敏反应: 颜面潮红、皮疹、瘙痒、胸部不适、甚至低血压、严重时可出现呼吸窘迫、全身性荨麻疹、血管神经性水肿。
- () 远期毒性: 长期应用可致畸胎、停经、精子缺乏、免疫抑制、产生继发性肿瘤
- () 手足综合征: 肢端麻木、感觉迟钝、感觉异常、针刺感、手掌、脚掌皮肤肿胀、红斑, 脱屑, 水泡、疼痛。严重者出现脱皮、脱趾甲。
- () 其他少见及不可预料的不良反应。

以上情况如实告知, 如同意接受治疗请签署意见并签名。

本人或家属意见: 同意、签名 [REDACTED] 主治医师: [REDACTED] 2011 年 7 月 21 日