

北京世纪坛医院  
麻醉方案及风险知情同意书

姓名：性别：年龄：科别：ICU 住院号：  
诊断：  
麻醉类型：全凭静脉  椎管内麻醉  神经阻滞麻醉  神经安定镇静  基础麻醉  
 低温麻醉  自体血回输  中心静脉穿刺置管术  动脉穿刺置管术  
 其他：

拟施行麻醉方案可能发生的医疗意外、并发症

- 麻醉过程中可能出现的医疗意外及并发症不局限于以下情况：
1. 医疗意外：  
(1) 虽然麻醉医师严格遵守麻醉操作规程，但使用各种麻醉药后，病人仍然有可能出现麻醉药中毒、过敏或高敏反应，甚至危及生命。  
(2) 麻醉时，特别是急症抢救病人，麻醉前虽已采取必要的预防措施，但仍不能完全避免有发生呕吐、反流、误吸，甚至窒息死亡的可能。  
(3) 在基础麻醉或椎管内局部麻醉时，使用安定等镇静药物，仍有可能发生呼吸抑制，血压下降或麻醉平面过高，虽然吸氧抢救，仍出现不良后果，甚至死亡。  
(4) 直接手术时麻醉的危险性明显高于插管干槽症的麻醉，死亡率、并发症发生率均较高。
  2. 麻醉相关的并发症：  
(1) 全身麻醉后出现呼吸道梗阻，呼吸抑制，恶性高热，精神异常。肌肉刺激感或长时间无呼吸，积极抢救后仍出现不良后果。  
(2) 呼吸道外麻醉可能发生全脊髓麻醉或硬膜外心脏骤停，出现腰背痛、头痛、硬膜外间隙感染、脓肿形成、硬脊膜外血肿、神经根或脊髓损伤。一次性或永久性下肢神经功能障碍，甚至截瘫等不良后果。硬膜外置管可发生导管打折、折断。  
(3) 硬膜下腔麻醉可导致腰背部头痛、头晕、脊髓损伤。一次性或永久性下肢神经功能障碍，感染、脑膜炎。当局麻药注入脑室，术后休眠期，穿刺粗刺可发生高血压、心脑血管意外、心律失常、心跳呼吸骤停等。  
(4) 由从麻醉可能引起的并发症有：对麻醉中肾上腺素的敏感性、呼吸暂停症、Horner's综合症、胸闷、呼吸困难及停止，迷入用麻药可引起全脊髓麻醉、高位硬膜外麻醉、椎动脉穿刺损伤引起丘脑、面部、感染等。  
(5) 普鲁卡因可能引起的并发症有：局麻药中毒、局部组织坏死、吸进神经阻滞、吸进神经阻滞、Horner's综合症、胸闷、呼吸困难及停止，注入局麻药可引起全脊髓麻醉、高位硬膜外麻醉、椎动脉穿刺损伤、椎动脉穿刺损伤引起出血、面部、感染等。  
(6) 外周神经阻滞麻醉可能引起出血、面部、直肠、膀胱损伤等。  
(7) 椎管内麻醉时，注射含麻药剂量过大时发生中毒，过敏或所吸收药物不良后果。  
(8) 麻醉诱发或加重已有的心脏病，冠状动脉粥样硬化性心脏病，麻醉过程中，发生各种类型的心律失常，神经营养代谢的血液循环力学改变等。

北京世纪坛医院

消化内镜诊断治疗知情同意书

姓名 [REDACTED] 性别 [REDACTED] 年龄 [REDACTED] 住院号 [REDACTED]

临床诊断

拟行检查治疗名称

内镜检查及治疗为侵入性检查和有创性治疗，可能出现以下情况：

1. 出血：（文献报道：胃镜 0.03%，结肠镜 0.008-0.17%）
2. 穿孔：（文献报道：胃镜 0.03%，结肠镜 0.14-0.22%）
3. 心脏意外：（文献报道 0.0005%）
4. 肺部并发症
5. 脑血管意外
6. 其他意外
7. 与治疗相关的意外

(1)

(2)

(3)

8. 检查过程中根据病情，可能出现追加费用（检查、治疗及耗材）。

申请医师签名

操作医师签名：

申请日期

病人或家属意见

我已仔细阅读了知情同意书全部内容，了解事项有关内镜检查及治疗可能出现的情况及并发症，并同意接受内镜检查及治疗。

签字：[REDACTED]

与病人的关系：[REDACTED]

日期：[REDACTED] 年 [REDACTED] 月 [REDACTED] 日

# 北京世纪坛医院

## 淋巴外科有创检查(治疗)同意书

住院号

姓名 [REDACTED] 性别 [REDACTED] 年龄 [REDACTED]

床号 12

临床诊断: 淋巴结肿大, 穿刺活检阳性

有创检查(治疗)项目: ( A )

- A. 直接淋巴管造影      B. 间接淋巴管造影      C. 静脉造影  
D. 胸腔穿刺(引流)      E. 腹腔穿刺(引流)      F. 心包穿刺  
G. 穿刺活检      H. 针吸活检      I. PICC

其它:

有创检查(治疗)可能发生的并发症:

1. 麻醉药、造影剂药物过敏, 休克、呼吸心跳停止等  
 2. 出血、血肿: 穿刺、针吸活检造成动脉及静脉损伤  
 3. 创伤: 穿刺、针吸活检造成组织、脏器损伤  
4. 气胸、血胸  
5. 肠管损伤、腹膜炎  
6. 血栓形成  
 7. 肺栓塞  
 8. 淋巴水肿, 乳糜漏加重  
 9. 感染, 皮肤、软组织坏死  
 10. 伤口延迟愈合或不愈合  
 11. 有创检查、治疗操作失败  
 12. 有创检查、治疗过程中发生重要器官功能损害; 心衰、呼吸、心梗、脑梗等

其它:

严重的并发症, 可能危及患者生命。

一旦发生并发症, 淋巴外科将积极治疗、抢救。

如同意有创检查、治疗, 请签字。

患者签名:

医师签名:

家属签名: [REDACTED]

时间: [REDACTED]