

中国中医科学院望京医院

化疗知情同意书

姓名	性别	男	年龄	82	病案号	病区	肿瘤	床号
临床诊断		食管恶性肿瘤						
合 并 症								
拟行化疗方案		多西他赛注射液80mg 静脉滴注						

1、化疗达到的疗效

化疗作为治疗肿瘤的主要手段之一已广泛应用于临床，并对多种肿瘤具有一定的疗效，部分肿瘤患者经过化疗可以得到根治，更多的患者经过化疗可以延长生存时间及改善生活质量。但是，不是所有的患者都适宜于化疗，也不是所有的肿瘤都对化疗敏感。

2、化疗可能引起的不良反应

化疗药物在杀死肿瘤细胞的同时，对人体的正常细胞也有一定的毒副作用。化疗的毒副作用主要表现为恶心呕吐、血象（血小板、白细胞等）降低、感染、脱发、口腔粘膜炎等常见症状，还可对人体的心、肺、肝、肾功能等造成不同程度的损害，严重时危及生命。化疗的毒副作用随所用药物及患者的耐受能力而异。

3、医生的责任

我们通过讨论尽可能的提供合理的化疗方案，以达到最佳疗效，同时，我们将尽力避免、预防和积极处理化疗的毒副作用。

4、患者的配合

在化疗中，患者应配合我们的检查和治疗。

如同意化疗，请家属（患者）签字。

患者或家属签字		与患者关系	本人
医师签字			

肿瘤免疫治疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 52 住院号: [REDACTED] 病区: 肿瘤
因你病情需要, 经我科集体讨论, 准备给予免疫治疗, 方案如下:

纳武利尤单抗 120mg 静脉滴注

免疫治疗一方面可以直接杀伤肿瘤细胞, 另一方面更重要的是通过作用于免疫系统, 增强机体的免疫应答, 并最终延长患者的生存期, 但是不能避免对正常组织的损伤, 因而在治疗过程中及过后可能出现以下毒副作用和不良反应。

- ☐ 胃肠道反应, 如恶心、呕吐、食欲下降、腹泻;
- ☐ 皮肤: 非严重性皮疹 (皮肤隆起、斑点或发红)、瘙痒 (皮肤发痒)
- ☐ 局部刺激: 如静脉炎、皮肤局部坏死、溃疡
- ☐ 过敏反应及超过敏反应
- ☐ 疲乏、关节痛
- ☐ 肝功能损害、甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症
- ☐ 非感染性肺炎 (肺部严重、引起新发咳嗽或咳嗽加重或呼吸短促)

严重副作用如下所示, 这些副作用可能危及生命或致命

- ☐ 免疫相关性肺炎
- ☐ 免疫相关性结肠炎
- ☐ 免疫相关性肝炎
- ☐ 免疫相关性脑炎
- ☐ 免疫相关性胰腺炎
- ☐ 免疫相关性垂体炎
- ☐ 免疫相关性心肌炎
- ☐ 肌肉溶解心肌炎
- ☐ 肾小球肾炎
- ☐ 糖尿病酮症酸中毒
- ☐ 眼器官疾病、严重的眼部炎症, 有时甚至会引起失明

以上毒副作用的发生与患者的个体差异有关, 有的患者出现症状较轻, 有的可能比较严重, 许多副作用可能会在停药后消失, 但是在一些情况下, 副作用可能会变得更严重, 长期持续, 永久性存在或危及生命, 并增加医疗费用, 但我们定会积极认真的进行救治

我本人 [REDACTED] 患者家属 对医师介绍以上的情况已清楚明白,
我同意进行上述方案的治疗, 对该治疗有可能出现上述的并发症或者意外
情况已充分理解, 并愿意积极配合, 服从医嘱及规章制度

告知医师:

告知时间:

患者签名:

患者法定代理人:

日

日