

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022 年 8 月 23 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022 年 8 月 23 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022 年 8 月 23 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名：

[Redacted Signature]

2022年 8 月 23 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2023年 8 月 21 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022 年 9 月 5 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022 年 9 月 5 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022年 9 月 5 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022年 9 月 5 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022年 9 月 5 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅你的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露你的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名



2022年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日

海南医学院第二附属医院

知情同意书

尊敬的先生/女士：

欢迎来到海南医学院第二附属医院消化内科。

COVID-19 大流行可引起各年龄段的人出现不良情绪，如焦虑、抑郁、无法控制的恐惧和孤独感。紧张的情况可能导致人们出现消化道功能紊乱等胃肠道疾病。研究还证明，在 COVID-19 大流行期间，IBS 症状可能会加重。

因此，评估 COVID-19 感染后发生功能性胃肠病（PI-FGID）的频率、范围和风险因素很有必要。现在我们邀请您参与我们的疾病研究调查。您和社会可能会从这些研究中受益，这可能有助于进一步了解这些疾病的发病机制，探索更新更好的诊断和治疗方法。调查人员将被允许对您进行电话随访并查阅您的医疗记录。对这项研究结果的任何公开报道都不会透露您的个人身份。我们将在法律允许的范围内，尽力保护您个人医疗信息的隐私。

我已阅读并理解（或已向我解释）上述信息，我自愿参加该研究。

参与者签名

2022 年 9 月 4 日