

遵义医学院附属医院遵义医科大学附属医院知情文件

索磷布韦维帕他韦治疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 51 岁 科室: [REDACTED]
床号: 住院号: [REDACTED]
诊断: 慢性丙型肝炎

拟采取治疗措施:

慢性丙肝的治疗具有可治性、复发性和长期治疗的特征, 索磷布韦维帕他韦是国际公认有效的抗HCV治疗的药物之一。但该药的使用应严格选择治疗对象, 把握恰当的治疗时机, 必须在有经验的肝病专科医生的指导下服用。

可能存在如下并发症及风险:

- 1、头痛、疲劳、恶心。
- 2、可能会出现病毒变异, 导致治疗无效, 甚至病情变化。
- 3、出现其他意想不到的情况。

使用索磷布韦维帕他韦时, 您应注意如下事项:

- 1、疗程至少12周, 但应强调疗程的个体化和长期性。
- 2、切忌自行停药, 否则可能会导致病情加重。
- 3、在治疗过程中必须密切随访肝功能。
- 4、根据病情需要检测血常规、血小板、血清肌酐等指标。
- 5、如果终止治疗, 在停药后至少六个月内应密切随访。

根据您的病情, 医生建议使用索磷布韦维帕他韦进行治疗。医生已详细告知该药的优点, 可能存在的并发症及风险, 使用该药时的注意事项等。我已详细了解, 经慎重考虑, 同意使用索磷布韦维帕他韦治疗, 并自愿承担相应的风险。

病人签名: [REDACTED] 2022 年 4 月 18 日

家属(或委托代理人)签名: 年 月 日

医师签名: [REDACTED] 2022 年 4 月 18 日

遵义医科大学附属医院

血液净化治疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 科室: 感染科病区 床号: 19 住院号: [REDACTED]
遵义医科大学附属医院血液净化治疗知情同意书

科别: 感染科病区 姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 50 岁 住院号: [REDACTED] 床号: 19

病情诊断: 肝硬化腹水
血液净化方式: ☐ 血液透析(滤过) ☒ 血浆置换 ☐ 连续肾脏替代治疗 ☐ 血液灌流
☐ 免疫吸附 ☐ 血脂吸附 ☐ 其他

血液净化治疗时需将患者血液引出体外, 通过特殊的装置进行透析或滤过或吸附, 清除水分、的装置进行透析或滤过或吸附, 清除水分、毒素和致病性物质, 处理后的血液再回送到患者体内。为了有效引出血液, 治疗前需建立血管通路(内瘘或深静脉插管), 为了防止血液在体外发生凝固, 通常于治疗前和治疗过程中需要注射肝素等抗凝药物。

血液净化期间存在以下医疗风险, 可能造成严重后果, 甚至危及生命:

- 1、低血压, 高血压, 心力衰竭, 心律失常, 心肌梗塞, 脑血管意外等。
- 2、出血、溶血、凝血等。
- 3、过敏反应、空气栓塞。
- 4、首次使用综合征、透析失衡综合征和电解质酸碱平衡紊乱等。
- 5、发热、感染等。
- 6、恶心、呕吐和肝功能异常等。
- 7、头痛、痉挛、抽搐, 甚至意识障碍等。
- 8、病毒性肝炎等传染病。
- 9、其他。如透析器/滤器凝血或破膜漏血而不得不更换; 穿刺、插管或造瘘部位出血、血肿、血栓、动脉瘤、肿胀手或静脉曲张等; 穿刺后血流量不足, 透析效果不佳, 须再次穿刺; 因停电、停水或其种原因所致设备故障而致使治疗中止等。

上述事件通常较少发生, 若一旦发生, 我科将积极处理, 希望病人、家属及单位领导能谅解支持, 并及时付清医疗费用。

此次签字后, 在本院行同类操作治疗将不再另行告知签字。

负责谈话医师签字: [REDACTED] 2022年04月29日

医生已充分告知血液净化治疗可能发生上述诸多事件, 以及血液净化治疗相关的规定, 本人及家属完全接受医疗风险的告知, 遵守血液净化治疗相关制度、规定, 并要求接受血液净化治疗, 配合医护人员, 定期监测相关指标, 签字为凭。

患者本人签字: [REDACTED]

患者家属或单位负责人签字 与患者关系 2022年04月29日

遵义医学院附属医院遵义医科大学附属医院知情文件

索磷布韦维帕他韦治疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: 51 岁 科室: [REDACTED]
床号: 住院号: [REDACTED]
诊断: 慢性丙型肝炎

拟采取治疗措施:

慢性丙肝的治疗具有可治性、复发性和长期治疗的特征, 索磷布韦维帕他韦是国际公认有效的抗HCV治疗的药物之一。但该药的使用应严格选择治疗对象, 把握恰当的治疗时机, 必须在有经验的肝病专科医生的指导下服用。

可能存在如下并发症及风险:

- 1、头痛、疲劳、恶心。
- 2、可能会出现病毒变异, 导致治疗无效, 甚至病情变化。
- 3、出现其他意想不到的情况。

使用索磷布韦维帕他韦时, 您应注意如下事项:

- 1、疗程至少12周, 但应强调疗程的个体化和长期性。
- 2、切忌自行停药, 否则可能会导致病情加重。
- 3、在治疗过程中必须密切随访肝功能。
- 4、根据病情需要检测血常规、血小板、血清肌酐等指标。
- 5、如果终止治疗, 在停药后至少六个月内应密切随诊。

根据您的病情, 医生建议使用索磷布韦维帕他韦进行治疗。医生已详细告知该药的优点, 可能存在的并发症及风险, 使用该药时的注意事项等。我已详细了解, 经慎重考虑, 同意使用索磷布韦维帕他韦治疗, 并自愿承担相应的风险。

病人签名: [REDACTED] 2022 年 4 月 18 日

家属(或委托代理人)签名: 年 月 日

医师签名: [REDACTED] 2022 年 4 月 18 日