

北京大学肿瘤医院
北京肿瘤医院
磁共振检查前确认表

ID号:

病案号:

先生 / 女士：您好！

磁共振检查需在强磁场中进行，并非所有患者均可适用，为确保安全，防止禁忌症患者发生意外，请您配合我们确认以下情况。

1. 您体内是否有下列植入物（绝对禁忌）..... 是 否

人工耳蜗	听小骨假体	植入前庭假体	眶内植入物或者设备	义眼	胰岛素泵	血糖监测仪	穿刺活检针	阴茎植入物
周围神刺激器	磁力喂食管	主动脉球囊泵	探查电极、导管导丝	植入式循环记录仪	起搏器的外部脉冲发生器			
植入式起搏器	植入式除颤器	临时静脉起搏线	脑深度电刺激术后	植入式心血管检测仪	拆除起搏器的残余导线			
肺动脉血液动力学监测导管	骨增长刺激器	脑室分流管接头	左心室辅助装置	颅内压监护仪	肺动脉热稀释导管			
定位针	胃电刺激植入	止痛泵	有线血液动力学导管	植入血液动力学支持设备	乳腺或其他组织扩张器			

2. 您是否有肾功能不全..... () (✓)
3. 您是否有过敏性哮喘及肺气肿类疾病..... () (✓)
4. 您是否已怀孕..... () (✓)
5. 您是否患过精神病或幽闭恐怖症..... () (✓)
6. 您是否做过动脉瘤手术，术中是否戴金属夹子..... () (✓)
7. 您是否患有严重心脏病或者做过心脏大血管手术..... () (✓)
8. 您是否贴有膏药及热敷灵..... () (✓)
9. 您是否有面积超过 5 平方厘米的纹身..... () (✓)
10. 您是否有纹眼线、纹眉、纹唇..... () (✓)
11. 您是否做过金属加工工作..... () (✓)
12. 您体内有否金属残留物，例如弹片、铁砂、金属碎屑等..... () (✓)
13. 您 3 个月内是否做过胃镜，并使用止血夹..... () (✓)
14. 您体内是否有安装如下器械或植入物..... () (✓)

瓣膜成型环	人工心脏瓣膜	动脉瘤栓塞弹簧圈	输液港、静脉留置导管	消化道植入物或支架	下腔静脉滤器
心脏闭合器	左心耳封堵器	输尿管双 J 支架	放射粒子	骨科钢板、钉	其他心血管植入器械

15. 体内是否有上面未提及的金属异物或者植入物？请说明：

16. 有上述未提及的金属植入物请严格按照使用说明书确保安全的情况下进行 MR 检查。


本人承诺上述填写的内容真实、完整，如有虚假，由本人承担由此产生的一切后果。根据以上情况，我 同意（同意 / 拒绝）进行磁共振检查。

患者 / 被委托人 / 监护人签字: _____ 体重: 65 公斤 (kg)

患者 / 被委托人 / 监护人联系方式: _____

患者 / 被委托人 / 监护人身份证号码: _____

2016 年 12 月 29 日



北京大学肿瘤医院
北京肿瘤医院
磁共振检查前确认表

ID号:

病案号:

MRI 检查知情同意书

MRI 检查需在强磁场中进行,为确保安全,患有幽闭恐惧症、安装心脏起搏器、动脉瘤术后、体部止血夹的患者严禁磁共振检查,体内有金属异物或铁磁性植入物、代偿心衰和早期妊娠的病人不能进行此项检查。

患者病情较重(如平卧困难、容易呛咳、身体衰弱、心脑血管疾患、生命体征不稳定、昏迷等)或体内含有金属异物等情况,在 MRI 检查时可能出现意外情况。

MRI 检查时间相对较长,检查过程中需病人配合。高龄或病情危重病人需家属陪同检查。检查前需要除去发卡、别针、项链、戒指、手表、假牙、假发、义眼、皮带、硬币、钥匙、信用卡、手机等金属及磁性物品,不要穿着有金属钩的内衣。家属及陪护人员未经许可不能进入磁体间,金属物品(包括轮椅、平车、监护设备和其他抢救设备)不能进入磁体间。如擅自进入,易造成人员伤亡及机器的损害。

胃肠道检查患者检查前 4 小时内请勿服用含有金属盐的药物。

腹盆部扫描需注射东莨菪碱,此药可有效减慢胃肠道蠕动,减少扫描中的胃肠蠕动伪影。用药后常见副作用有:口干,少见的有心率加快等。青光眼、前列腺肥大、心动过速者禁用。

我已对上述情况充分知情,并保证遵守上述规定,配合同意进行 MRI 检查。

患者签字:

签字日期:

2016.12.29

MRI 增强检查知情同意书

MRI 增强扫描需静脉注射 MRI 对比剂,其作用在于提高诊断的准确性和进行鉴别诊断,并有助于发现平扫未检出的病变。

目前的研究表明 MRI 对比剂具有良好的耐受性,很少发生全身毒副反应或过敏反应。尽管如此,注射造影剂仍有发生以下情况的可能:

- 1、恶心、呕吐、过敏性皮肤粘膜反应等,注射部位及周围灼热感或疼痛等。
- 2、采用高压注射器注入对比剂,可能出现对比剂外渗进入血管周围组织间隙内并引起疼痛,以及由此继发的不同程度组织损害。
- 3、严重肾功能损害、癫痫、低血压、哮喘及其他变态反应性呼吸道疾病患者及有过敏倾向者谨慎使用。如有上述情况,患者或家属应提前告知磁共振室医护人员。
- 4、过敏反应多在注药后 20 分钟左右出现。病人,应在检查完后留诊观察半小时方可离院。若离院后出现不适,应速在就近医院诊治。
- 5、严重的过敏反应或其它因素可能导致意外情况发生,如喉头水肿、休克、心脑血管意外等所致的昏迷、死亡等严重并发症。

我已对上述情况充分知情,同意进行 MRI 增强扫描。

患者签字:

签字日期:

2016.12.29

签字地点: 医学影像科