

الموافقة على عمل عملية جراحية بالغم مع المخدر الموضعي والعقاقير اللازمة

أفهم تماماً هذه المضاعفات - والتي هي نادرة الحدوث في معظمها- أنها قد تشمل ما يلي:

1. ألم، تورم، نزيف أو عدوى قد تتبع العملية الجراحية / وخلع السن.
2. حدوث بعض الإصابات للأسنان، الحشوات، أو التركيبات المجاورة لمكان الجراحة / وخلع السن.
3. حدوث صعوبة في فتح الفم لبعض الأيام وأحياناً لبعض الأسابيع.
4. قد يقرر الطبيب أن يترك بقايا الجذور الصغيرة في الفك، نظراً لأن محاولة إخراجها قد تتطلب جراحة واسعة قد تعرض المريض لخطر زائد، على أن يخطرني بهذا الأمر لأكون على علم.
5. في حالة وجود إصابة في المفصل الفكي، قد تسوء الحالة أو يشتد الألم، حتى في حالة غياب هذه الأعراض قبل بدء الجراحة.
6. ضعف عظام الفك، أو في حالات نادرة قد يحدث كسر للفك.
7. فقد الاحساس أو حدوث ألم أو تغير الاحساس في الأسنان، اللثة، الشفاه، اللسان، بما في ذلك حاسة التذوق - نتيجة لقرب جذور الضروس السفلى (وخاصة ضرس العقل) من الأعصاب- ولذلك من الوارد إصابتها أثناء الجراحة. وفي أغلب الحالات يعود الاحساس إلى طبيعته ولكن في حالات نادرة جداً قد يكون فقد الاحساس دائماً.
8. مضاعفات خلع ضروس الفك العلوي أن يحدث فتحة في الجيب الفكي العلوي، والتي قد تتطلب علاجاً بالأدوية أو جراحة أخرى.
9. قد يحدث تأخر لعملية التئام الجرح أو حدوث حالة "السنخ الجاف" وهي ألم في الفك مصاحب لموضع الجراحة يظهر بعد أيام من الجراحة، والتي تتطلب عناية طبية إضافية.
10. حدوث آثار جانبية تجاه العقاقير الموصوفة من الطبيب.
11. حدوث تشققات أو كدمات عند زوايا الشفاه.
12. عند استخدام العقاقير عن طريق الحقن الوريدي، فمن الممكن حدوث ألم أو كدمات في أماكن الحقن.
13. من الوارد احتياج عملية جراحية إضافية بالانتقال إلى مركز طبي ذو إمكانيات أعلى.

- ◀ لقد ناقشت تاريخي الطبي والمرضي والاجتماعي، بما في ذلك المخدرات وتعاطي الكحول، مع الاعتراف بأن حجب المعلومات قد يؤثر على الأهداف المرجوة من العملية الجراحية.
- ◀ أنا أتفهم - إن كنت من مستخدمي التبغ- أنه يجب التوقف عن استخدام جميع منتجات التبغ قبل وبعد الجراحة على الأقل بأسبوعين.
- ◀ أنا أتفهم أن كلا من المخدر وبعض الأدوية الموصوفة بعد الجراحة قد تضعف التركيز والمهارات الحركية وما من شأنه أن يزيد هذه الآثار هو تناول الكحول/ أو بعض الأدوية الأخرى.
- ◀ لقد نصحت بعدم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول هذه الأدوية.
- ◀
- ◀ الآباء أو الأوصياء المصاحبين للأطفال أو القصر عليهم التواجد في العيادة لحين إتمام العلاج والإفاقة الكاملة من المخدر.
- ◀ أنا أفهم أن أي مضاد حيوي بوصف قد يتداخل مع فعالية حبوب منع الحمل.

- لقد تم شرح كل ما يتعلق بالجراحة والتخدير لإرضائي، كما قمت بمراجعة جميع خيارات العلاج الممكنة بما في ذلك خيار الـ "لا علاج".
- أنا أفهم أن العلاج المثالي غير مضمون.
- توقعي أدناه يشير إلى موافقتي وفهمي للعلاج المقترح، ولهذا أعطيت موافقتي على الجراحة والتخدير.

December 13, 2020	التاريخ		توقيع المريض أو الوصي عليه
			رقم بطاقة الأحوال الشخصية / الإقامة:
December 13, 2020	التاريخ		توقيع الطبيب المعالج

الموافقة على عمل عملية جراحية بالغم مع المخدر الموضعي والعقاقير اللازمة

أنا _____ على علم تام بالمضاعفات المحتملة لأي عملية جراحية أو تخدير موضعي، وأنا أفهم تماما هذه المضاعفات - والتي هي نادرة الحدوث في معظمها- أنها قد تشمل ما يلي:

1. ألم، تورم، نزيف أو عدوى قد تتبع العملية الجراحية / وخلع السن.
2. حدوث بعض الإصابات للأسنان، الحشوات، أو التركيبات المجاورة لمكان الجراحة / وخلع السن.
3. حدوث صعوبة في فتح الفم لبعض الأيام وأحيانا لبعض الأسابيع.
4. قد يقرر الطبيب أن يترك بقايا الجذور الصغيرة في الفك، نظرا لأن محاولة إخراجها قد تتطلب جراحة واسعة قد تعرض المريض لخطر زائد، على أن يخطرني بهذا الأمر لأكون على علم.
5. في حالة وجود إصابة في المفصل الفكي، قد تسوء الحالة أو يشتد الألم، حتى في حالة غياب هذه الأعراض قبل بدء الجراحة.
6. ضعف عظام الفك، أو في حالات نادرة قد يحدث كسر للفك.
7. فقد الاحساس أو حدوث ألم أو تغير الاحساس في الأسنان، اللثة، الشفاه، اللسان، بما في ذلك حاسة التذوق - نتيجة لقرب جذور الضروس السفلى (وخاصة ضرس العقل) من الأعصاب- ولذلك من الوارد إصابتها أثناء الجراحة. وفي أغلب الحالات يعود الاحساس إلى طبيعته ولكن في حالات نادرة جدا قد يكون فقد الاحساس دائم.
8. مضاعفات خلع ضروس الفك العلوي أن يحدث فتحة في الجيب الفكي العلوي، والتي قد تتطلب علاجاً بالأدوية أو جراحة أخرى.
9. قد يحدث تأخر لعملية التئام الجرح أو حدوث حالة "السنخ الجاف" وهي ألم في الفك مصاحب لموضع الجراحة يظهر بعد أيام من الجراحة، والتي تتطلب عناية طبية إضافية.
10. حدوث آثار جانبية تجاه العقاقير الموصوفة من الطبيب.
11. حدوث تشققات أو كدمات عند زوايا الشفاه.
12. عند استخدام العقاقير عن طريق الحقن الوريدي، فمن الممكن حدوث ألم أو كدمات في أماكن الحقن.
13. من الوارد احتياج عملية جراحية إضافية بالانتقال إلى مركز طبي ذو إمكانيات أعلى.

- لقد ناقشت تاريخي الطبي والمرضي والاجتماعي، بما في ذلك المخدرات وتعاطي الكحول، مع الاعتراف بأن حجب المعلومات قد يؤثر على الأهداف المرجوة من العملية الجراحية.
- أنا أتفهم - إن كنت من مستخدمي التبغ- أنه يجب التوقف عن استخدام جميع منتجات التبغ قبل وبعد الجراحة على الأقل بأسبوعين.
- أنا أتفهم أن كلا من المخدر وبعض الأدوية الموصوفة بعد الجراحة قد تضعف التركيز والمهارات الحركية وما من شأنه أن يزيد هذه الآثار هو تناول الكحول/ أو بعض الأدوية الأخرى.
- لقد نصحت بعدم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول هذه الأدوية.
- الآباء أو الأوصياء المصاحبين للأطفال أو القصر عليهم التواجد في العيادة لحين إتمام العلاج والإفاقة الكاملة من المخدر.
- أنا أفهم أن أي مضاد حيوي بوصف قد يتداخل مع فعالية حبوب منع الحمل.

لقد تم شرح كل ما يتعلق بالجراحة والتخدير لإرضائي، كما قمت بمراجعة جميع خيارات العلاج الممكنة بما في ذلك خيار الـ "لا علاج".

أنا أفهم أن العلاج المثالي غير مضمون.

توقعي أدناه يشير إلى موافقتي وفهمي للعلاج المقترح، ولهذا أعطيت موافقتي على الجراحة والتخدير.

December 15, 2020	التاريخ		توقيع المريض أو الوصي عليه
			رقم بطاقة الأحوال الشخصية / الإقامة:
December 15, 2020	التاريخ		توقيع الطبيب المعالج

الموافقة على عمل عملية جراحية بالغم مع المخدر الموضعي والعقاقير اللازمة

أنا _____ على علم تام بالمضاعفات المحتملة لأي عملية جراحية أو تخدير موضعي، وأنا أفهم تماما هذه المضاعفات - والتي هي نادرة الحدوث في معظمها- أنها قد تشمل ما يلي:

1. ألم، تورم، نزيف أو عدوى قد تتبع العملية الجراحية / وخلع السن.
2. حدوث بعض الإصابات للأسنان، الحشوات، أو التركيبات المجاورة لمكان الجراحة / وخلع السن.
3. حدوث صعوبة في فتح الفم لبعض الأيام وأحيانا لبعض الأسابيع.
4. قد يقرر الطبيب أن يترك بقايا الجذور الصغيرة في الفك، نظرا لأن محاولة إخراجها قد تتطلب جراحة واسعة قد تعرض المريض لخطر زائد، على أن يخطرني بهذا الأمر لأكون على علم.
5. في حالة وجود إصابة في المفصل الفكي، قد تسوء الحالة أو يشتد الألم، حتى في حالة غياب هذه الأعراض قبل بدء الجراحة.
6. ضعف عظام الفك، أو في حالات نادرة قد يحدث كسر للفك.
7. فقد الاحساس أو حدوث ألم أو تغير الاحساس في الأسنان، اللثة، الشفاه، اللسان، بما في ذلك حاسة التذوق - نتيجة لقرب جذور الضروس السفلى (وخاصة ضرس العقل) من الأعصاب- ولذلك من الوارد إصابتها أثناء الجراحة. وفي أغلب الحالات يعود الاحساس إلى طبيعته ولكن في حالات نادرة جدا قد يكون فقد الاحساس دائم.
8. مضاعفات خلع ضروس الفك العلوي أن يحدث فتحة في الجيب الفكي العلوي، والتي قد تتطلب علاجاً بالأدوية أو جراحة أخرى.
9. قد يحدث تأخر لعملية التئام الجرح أو حدوث حالة "السنخ الجاف" وهي ألم في الفك مصاحب لموضع الجراحة يظهر بعد أيام من الجراحة، والتي تتطلب عناية طبية إضافية.
10. حدوث آثار جانبية تجاه العقاقير الموصوفة من الطبيب.
11. حدوث تشققات أو كدمات عند زوايا الشفاه.
12. عند استخدام العقاقير عن طريق الحقن الوريدي، فمن الممكن حدوث ألم أو كدمات في أماكن الحقن.
13. من الوارد احتياج عملية جراحية إضافية بالانتقال إلى مركز طبي ذو إمكانيات أعلى.

- لقد ناقشت تاريخي الطبي والمرضي والاجتماعي، بما في ذلك المخدرات وتعاطي الكحول، مع الاعتراف بأن حجب المعلومات قد يؤثر على الأهداف المرجوة من العملية الجراحية.
- أنا أتفهم - إن كنت من مستخدمي التبغ- أنه يجب التوقف عن استخدام جميع منتجات التبغ قبل وبعد الجراحة على الأقل بأسبوعين.
- أنا أتفهم أن كلا من المخدر وبعض الأدوية الموصوفة بعد الجراحة قد تضعف التركيز والمهارات الحركية وما من شأنه أن يزيد هذه الآثار هو تناول الكحول/ أو بعض الأدوية الأخرى.
- لقد نصحت بعدم قيادة السيارة أو تشغيل الآلات أثناء تناول هذه الأدوية.
- الآباء أو الأوصياء المصاحبين للأطفال أو القصر عليهم التواجد في العيادة لحين إتمام العلاج والإفاقة الكاملة من المخدر.
- أنا أفهم أن أي مضاد حيوي بوصف قد يتداخل مع فعالية حبوب منع الحمل.

لقد تم شرح كل ما يتعلق بالجراحة والتخدير لإرضائي، كما قمت بمراجعة جميع خيارات العلاج الممكنة بما في ذلك خيار الـ "لا علاج".

أنا أفهم أن العلاج المثالي غير مضمون.

توقعي أدناه يشير إلى موافقتي وفهمي للعلاج المقترح، ولهذا أعطيت موافقتي على الجراحة والتخدير.

التاريخ December 21, 2020		توقيع المريض أو الوصي عليه
		رقم بطاقة الأحوال الشخصية / الإقامة:
التاريخ December 21, 2020		توقيع الطبيب المعالج