

# 天津医科大学总医院

## 妇产科剖宫产术前签字

姓名: [REDACTED] 年龄: 28岁

住院号: [REDACTED]

患者目前诊断1. 孕1产0孕27+2周 2. LSA 3. 系统性红斑狼疮活动期4. 抗磷脂综合征5. 狼疮性肾病6. 重度子痫前期 7. 血小板减少性紫癜8. 死胎9. 双下肢静脉血栓 因系统性红斑狼疮活动期 重度子痫前期 拟定于2019年01月11日行剖宫产或剖宫取胎术, 现将术前、术中和术后可能发生的主要情况向家属和患者本人交代, 希望家属和患者本人有所了解, 同意手术, 签字, 并积极配合医院的诊断治疗工作。

- 1、麻醉意外;
- 2、术中大出血, 可能引起失血性休克, 经积极处理后, 仍出血较多, 有切除子宫可能;
- 3、羊水栓塞、DIC、休克、多系统器官功能障碍甚至死亡;
- 4、邻近器官和组织损伤, 包括肠管、输尿管和膀胱等, 如为瘢痕子宫, 周围脏器损伤机会更大;
- 5、术前已经明确诊断, 现有医疗条件术前、术中和术后短期内均不能明确诊断的新生儿畸形;
- 6、术后肠粘连和肠梗阻; 再次手术时因盆腔粘连严重, 手术风险增加, 易发生肠道、输尿管以及膀胱损伤;
- 7、术后盆腔或下肢静脉血栓形成, 甚至肺栓塞, 危及生命;
- 8、术后可能出现脂肪液化或感染、伤口裂开、伤口延期愈合甚至需要二次缝合;
- 9、产后出血和晚期产后出血, 盆腔感染, 继发不孕可能;
- 10、剖宫产术后远期并发症较多, 术后2年内不宜再次妊娠, 可致子宫破裂; 发生子宫瘢痕妊娠史, 流产风险高, 可致大出血, 失血性休克, 严重者需切除子宫, 挽救生命。

11、可能使用自费类药物。

12. 系统性红斑狼疮活动期、狼疮性肾病、抗磷脂综合征、血小板减少, 病情加重已导致死胎, 病情进展可出现肾功能衰竭、狼疮性脑病、狼疮性肺病、肺纤维化、肺动脉高压、肝损害、皮肤损害、关节损害。狼疮性脑病, 可能出现癫痫持续发作, 脑出血, 脑栓塞, 脑水肿, 脑疝, 急性心衰, 呼吸循环衰竭, 心律失常, 心脏骤停, 肝肾等多脏器衰竭, 水电解质紊乱加重, 危及生命。术后ICU治疗, 费用昂贵, 预后不可预知。

13、双下肢静脉血栓: 病情加重, 栓子脱落引起肺栓塞、脑栓塞, 危及生命。拟术前于双下肢置静脉滤网预防血栓脱落, 可能滤网无法取出, 术后长期抗凝治疗等。

14. 血小板减少性紫癜, 术中术后出现大出血, 失血性休克, 有切除子宫可能; 有各脏器出血风险, 术后病情加重, 出现重度贫血, 血小板减少, 出血、感染, 多器官损伤等, 严重者危及生命, 需ICU治疗, 费用昂贵。

15. 合并重度子痫前期, 可能出现子痫、HELLP综合征, 脑出血、脑栓塞、高血压脑病、脑疝、视网膜脱落、失明、心、肝、肾、脑等重要脏器衰竭; 凝血功能障碍、DIC等, 危及生命。

经治医师已经向家属和/或本人详细交代上述情况, 家属和/或本人理解, 同意手术, 双方签字。

经治医师:



患者本人:

家属签字:

与患者关系:

2019年1月10日10时0分