

南昌大学第二附属医院

玻璃体腔注射药物(傲迪适)手术知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 女 年龄: 40岁 科室: 眼科 床号: 36 住院号: [REDACTED]

疾病介绍和治疗建议

医生已告知我的左眼患有后巩膜炎,需要在局部麻醉下进行玻璃体腔注射药物手术。

由外伤等疾病引起的葡萄膜炎严重危害患者的视力,如果不进行治疗,很多患者将在数周或数月后发生感光细胞及色素上皮细胞变性,从而造成患者进一步的视力损害。

傲迪适是一种长效糖皮质激素缓释制剂,半衰期长,在眼内缓慢释放地塞米松有效成分,具有消炎、抑制细胞增生、减少渗出等作用,通过玻璃体注射术将傲迪适带入玻璃体腔,逐渐作用在眼内发挥作用,对减轻眼部葡萄膜炎有一定疗效,可以稳定视力或减缓视力下降。

然而,尽管文献报道傲迪适治疗葡萄膜炎取得一定疗效,但它仍然不是针对病因的治疗,有些患者病情较重或原发疾病未获控制而治疗效果不佳。有些患者治疗后葡萄膜炎可能复发,也可能需要重复治疗。

根据每一位病人的具体病情,手术情况有所不同,您的医生将会和您讨论具体的内容。

其他

手术潜在风险和对策:

以下是玻璃体腔注射药物(傲迪适)手术常见的一些风险,有些不常见的风险可能没有在此列出,具体的手术术式根据不同病人的情况有所不同,医生告诉我可与我的医生讨论有关我手术的具体内容,如果我有特殊的问题可与我的医生讨论。

1. 我理解任何手术麻醉都存在风险。
2. 我理解任何所用药物都可能产生副作用,包括轻度的恶心、皮疹等症状到严重的过敏性休克,甚至危及生命。
3. 我理解此手术存在以下风险和并发症:
 - 1) 高眼压。
 - 2) 白内障。
 - 3) 球结膜下出血。

- 4) 角膜上皮损伤。
- 5) 术后炎症反应。
- 6) 假性前房积脓：激素结晶进入前房。
- 7) 无菌性玻璃体炎。
- 8) 眼内炎：文献报道，发生率为 0.87%。
- 9) 眼内出血。
- 10) 视网膜脱离。
- 11) 黄斑水肿病情不能控制。
- 12) 术中可能根据情况而改变术式。
- 13) 术后需要按医生要求定期复查，必要时重复注射治疗。

4. 如果患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全、静脉血栓等疾病或者有吸烟史，以上这些风险可能会加大，或者在术中或术后出现相关的病情加重或心脑血管意外，甚至死亡。

特殊风险或主要高危因素

我理解根据我个人的病情，除上述风险以外，还可能出现以下特殊并发症或风险：

一旦发生上述风险和意外，医生会采取积极应对措施。

患者知情选择

- 1、我的医生已经告知我将要进行的操作方式、此次操作及操作后可能发生的并发症和风险、可能存在的其他治疗方法并且向我解答了关于此次操作的相关问题。
- 2、我同意在操作中医生可以根据我的病情对预定的操作方式作出调整。
- 3、我理解我的操作需要多位医生共同进行。
- 4、我并未得到操作百分之百成功的许诺。
- 5、我授权医师对操作涉及的病变器官、组织、标本及影像资料等进行处置，包括病理学检查、细胞学检查、科学研究和医疗废物处理等。
- 6、我已如实向医生告知我的所有病情，如有隐瞒，一切后果自负。

患者签名

[Redacted Signature]

签名日期 2019 年 5 月 24 日

如果患者无法签署知情同意书，请其授权的亲属在此签名：