兰州军区兰州总医院

姓名 [redacted]

手术知情同意书

疾病介绍和治疗建议

医生已告知我患有：颈6椎管内占位性病变；其需在全麻俯卧下进行脊柱病损切除术、椎管减压术（经甲状内切入）。

替代手术方案：保守治疗。患者椎管内有明确占位，目前有明显神经症状，手术指征明确，且长期保守治疗后症状无缓解，有手术指征。

手术目的：

能最大中医疗效地切除病灶，尽可能减少组织损伤，使用内固定恢复脊柱稳定性，脊柱外科只能尽最大努力解除导致神经受压、功能缺损的压迫因素，不能恢复神经功能。患者术后神经症状、神经受压对别、程度是否能够得到神经复苏、环完得以最有直接和决定性关系。

手术潜在风险和对策：

医生告知我以下手术可能发生的风险，虽然不常见的风险可能没有在此列出，具体的手术式根据不同病人的情况有所不同，医生告诉我与我的医生讨论有关我手术的具体内容。

1. 我理解任何手术麻醉都存在风险。2. 我理解任何用药都可能产生副作用，包括轻度恶心、皮疹等症状到严重的过敏性休克，甚至危及生命。

3. 我理解此手术可能发生的风险及并发症：1）术中损伤脊髓、脊神经根、脊柱动脉等重要血管，导致术中大出血，严重者可致休克，导致患者死亡；2）手术中损伤脊髓、神经根等重要结构，造成重要脊髓神经功能缺失，或危及生命，术后恢复不良；3）术中可能损伤硬脊膜，严重时可能发生脑脊液漏，严重者可致颅内感染，甚至危及生命。4）术中根据病变情况或因解剖部位复杂或术中止不住血，必要时需扩大手术范围，必要时需行前路手术或可能需二次或多次手术治疗；5）应用内固定器械时可能出现：①内固定物压迫、损伤神经、血管等周围结构，②内固定钉的脱出、断钉、融合器移位等后，固定部位的疼痛；③植入物的排异反应而产生发热等症状。6）术后出现血肿压迫脊髓、脊神经而早发重，可能导致内固定松动、断裂或脱落等；12）损伤手术后可能出现局部性疼痛等症状，长期不愈、或更难、或更难、或更难