

三亚市中医医院 手术同意书

科别: 骨

床号:

病人姓名

性别

年龄

住院号

诊断: 骨盆骨折

拟施手术: 骨盆骨折复位内固定

拟施麻醉方式: 全麻

术中及术后可能发生的问题:

患者因患上述疾病需要进行手术治疗。由于医学科学的特殊性和个体差异, 在手术过程中及手术后, 有可能出现以下情况:

- 1、麻醉意外导致心跳、呼吸骤停且复苏不成功。
- 2、手术意外(操作部位大出血、损伤血管、神经、邻近脏器生理变异, 病变粘连等导致意外损伤)。
- 3、手术效果不理想, 如病灶(肿瘤)不能完全切除, 或术后复发等。
- 4、切口感染, 愈合不良。
- 5、药物不良反应, 含药物过敏死亡。
- 6、术后功能障碍, 并发症及其他难以预料的危及患者生命或致残的意外情况。

7、其它:

- 1、麻醉并发症和麻醉意外, 严重者可致休克, 危及生命。
- 2、手术需在止血带下进行, 止血带有可能造成一过性或永久性神经损伤。
- 3、术中因解剖位置变异或一些难以预计情况(包括患者的健康原因), 需变更术式或终止手术。若无条件再植, 患者选择残修术。
- 4、术中探查发现皮瓣缺损、需行皮瓣修复手术。
- 5、术中神经牵拉或分离引起损伤, 导致肢(指)体一过性或永久性障碍。
- 6、术中血管损伤导致大出血, 严重者可致休克, 缺血性挛缩甚至危及生命。
- 7、术中发现有血管、神经、骨、肌腱缺损, 则需取相应组织移植。
- 8、术中如取组织移植, 存在供区副损伤, 术后供区留下瘢痕, 引起功能障碍影响美观。
- 9、术中因骨缺损需行植骨, 或因骨关节损伤, 需行关节融合, 术后影响关节功能。
- 10、术后内固定并发症: 内固定物松动、断裂、脱落、全属过敏反应, 固定螺钉松动、断裂、脱落可能。
- 11、伤口并发症: 出血、血肿、裂开、不愈合、感染、瘻管及窦道形成; 肢(指)体肿胀伤口不能一期闭合, 需植皮或延迟关闭等。
- 12、术后肌腱粘连或再次断裂, 需再次松解或修复手术
- 13、术后因皮瓣过度牵位、挤压等影响, 血运差, 皮瓣坏死, 需再次手术; 即使皮瓣成活, 也可出现感觉障碍, 且影响美观。
- 14、术后出现血管危象, 如保守治疗无效, 需再次手术。
- 15、术后神经、肌腱修复重建后功能恢复不满意。
- 16、术后感染, 骨延迟愈合、畸形愈合、不愈合, 甚至继发性骨髓炎, 如保守治疗无效, 需再次手术。
- 17、术后骨骼缺血性坏死, 涉及关节面的创伤, 可并发创伤性关节炎。

18、术后患肢制动可能引起关节僵直、骨质疏松、肌肉萎缩、关节挛缩以及石膏（夹板）压迫性溃疡。

19、创伤后逐渐出现肢体畸形

20、术后功能难恢复到正常功能。

21、术后出现患肢筋膜室综合征，需切开减压。

22、诱发原有或潜在疾病。

23、糖尿病患者术中，术后高渗性昏迷，低血糖性休克、酮症酸中毒可能。

24、其他并发症：心血管并发症：心律失常；心肌梗塞、心衰、心跳骤停及脑血管意外等；

呼吸并发症：肺部感染，坠积性肺炎、气胸、支气管肺炎、肺不张、胸腔积液等；消化系统并发症：应激性溃疡；泌尿系感染，结石。

25、其他难以预料情况发生。

患者及家属意见：

同意

病人或直系亲属签名：

[Redacted Signature]

科主任（负责人）：

董建

医师：

胡嘉祥

2018 年 10 月 31 日