

广西医科大学第一附属医院

手术知情同意书

庚案号: [REDACTED]

姓名: [REDACTED]

性别: 女

年龄:

79岁3月

科室: 创伤骨科手外科

一、病情及所需手术

医生已解释如下病情(诊断):

1. 右尺骨骨髓炎
2. 右尺骨鹰嘴骨折内固定术后

结合上述病情(诊断)建议做如下手术:

右尺骨骨髓炎病灶清除术

二、手术风险

上述手术有如下风险:

1. 麻醉意外, 严重者可致休克、甚至危及生命。
2. 术中损伤神经、血管及邻近器官, 如运动神经损伤致相应肌肉功能失支配, 引起肢体功能障碍甚至残疾; 皮神经损伤致相应部位麻木疼痛; 血管损伤导致大出血, 严重者可致休克, 肢体缺血性挛缩甚至危及生命, 术中大出血, 导致循环障碍, 休克, 需大量输血, 甚至死亡可能。
3. 围手术期心、肺、脑血管意外出现: 脑出血或脑栓塞, 心律失常, 心肌梗死, 心力衰竭, 肺栓塞, 呼吸衰竭甚至死亡。
4. 伤口并发症: 出血、血肿、裂开、不愈合、感染, 瘻管及窦道形成; 各种原因伤口不能一期闭合, 需植皮、皮瓣移植或延迟关闭等; 术后切口或创口部疤痕形成, 甚至可能形成增殖性疤痕或疤痕疙瘩。
5. 术中止血带或尿管并发症, 皮肤、血管、神经等损伤, 尿管脱落, 尿道, 膀胱损伤等出现。
6. 感染病灶清除不彻底, 甚至引起败血症可能。
7. 感染病灶清除彻底, 但不排除有致病菌残留, 造成继续感染可能。
8. 术后感染: 包括创面感染、肺部感染、尿路感染甚至全身感染等, 严重者死亡。
9. 需再次手术行骨髓炎病灶清除术;

10. 术中术后发生脂肪栓塞, 严重可致生命意外。
 11. 术后因长期卧床可能出现坠积性肺炎、褥疮、废用性骨质疏松、血栓闭塞性脉管炎、泌尿系感染、下肢静脉血栓形成, 严重者肺栓塞, 甚至死亡。
 12. 伤口感染, 内固定松动、断裂、移位, 需取出内固定, 进一步治疗。
 13. 骨延迟愈合、不愈合, 畸形愈合, 需二次手术、植骨等。
 14. 术后患肢功能恢复欠佳。
 15. 因现代医学局限性和每一个体的体质差异性而发生难以预料和防范的不良后果。
 16. 其他。
- (以上内容为医师所告知的患者的病情所需手术及其风险。)

如您已经明白和理解医师告知的以上内容, 请在下面横线上签字

我已明白和理解医师告知的全部内容

(请于横线上抄写: 我已明白和理解医师告知的全部内容)

(患者本人/患者代理人签字)