

北京地坛医院
肝脏肿瘤射频消融术前知情同意书

姓名：[REDACTED] 性别：女 年龄：25 科室：肿瘤内科 床号：06 病案号：440269

术前诊断：原发性肝癌

经皮穿刺肝癌射频消融手术具有微创、并发症少、副作用小的特点，能有效控制肿瘤、缓解症状、稳定病情、改善患者生活质量，已成为肿瘤综合治疗的重要手段。但在射频消融术中及术后可能发生以下一些意外和 / 或并发症，在此，向患者及家属交待主要手术风险如下：

1. 麻醉意外，严重者过敏性休克危及生命可能。
2. 穿刺过程中肝脏或肿瘤破裂出血或消化道出血导致失血性休克。
3. 受患者呼吸动作的影响导致消融针伤及心脏大血管，房颤、房扑、心跳骤停、大出血，严重者危及生命。
4. 肿瘤临近胆囊，迷走神经兴奋、胆心反射引起血压下降、呼吸心跳骤停。
5. 气胸、血气胸可能，严重者需行胸腔引流。
6. 胆瘘，胆汁性腹膜炎可能。
7. 术后穿刺进针部位出血、疼痛。
8. 继发感染或出现肿瘤崩解综合征导致肝肾功能衰竭。
9. 肿瘤复发、转移；进一步进展。
10. 特殊原因导致射频消融不成功，但仍需支付射频针费用。
11. 其它

鉴于目前临床可能面临各种复杂的情况和其他难以预测因素，尽管医生尽了最大的努力，仍难以完全避免上述情况的发生，故患者亦应承担一定的医疗风险，并对此表示理解。

患者或家属意见 _____ 患者或家属签字 _____ [REDACTED]

签字人与患者关系 _____ 手术医师签字 _____ 李文东

日期 2016 年 8 月 10 日

北京地坛医院肿瘤介入科

手术知情同意书

患者姓名 _____ 性别 女 年龄 25 病区 肿瘤内科 床号 06 病案号 440269

术前诊断 原发性肝癌

手术名称 经肝动脉化疗栓塞术

手术目的 控制肿瘤

介入术中和术后可能出现的并发症和特殊情况:

基本操作: 1. 对比剂过敏 (1%-3%)。 2. 穿刺部血肿 (5%)。 3. 血管内膜损伤, 导致血管闭塞或动脉瘤 (<1%)。 4. 由于难以预料的原因未达到预期的疗效 (<3%)。 5. 由于病情复杂和操作难度大, 导致手术失败。

血管栓塞: 1. 血管变异导致栓塞术失败。 2. 异位栓塞。 3. 栓塞后综合征 (发热、恶心、腹痛、腹胀等)。 4. 肝动脉栓塞术后肝功能波动。 5. 有上消化道静脉重度曲张和/或门静脉栓塞时, 术后增加上消化出血机率。 6. 炎症。 7. 肿瘤患者术后病灶复发或转移。

穿刺操作: 1. 穿刺靶血管失败。 2. 局部脏器、组织损伤 (出血、气胸、血管及胆管损伤等)。 3. 腹腔出血、腹腔感染。 4. 恶性病变穿刺道转移 (发生率<0.1%)。

其它特殊情况: _____

鉴于目前临床可能面临各种复杂的情况和其他难以预测因素, 尽管医生尽了最大的努力, 仍难以完全避免上述情况的发生, 故患者亦应承担一定的医疗风险, 并对此表示理解。

如同意行此手术, 请签字:

患者或家属意见

患者或家属签字

决定手术医师签字

签字人与患者关系

经治医师签字

日期 2016 年 8 月 2 日