

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 糖皮质激素治疗知情同意书

1 这是一份有关糖皮质激素治疗的告知书。目的是告诉您有关医生建议您进行糖皮质激素治疗的相关事宜。请您仔细阅读，提出与本次糖皮质激素治疗有关的任何疑问，决定是否同意相关治疗。

2 医生会用您通俗易懂的语言给您解释目的、预期的效果：

您的目前的诊断是：高嗜酸性粒细胞血症，临床上有贫血等主要症状/损害。基于控制病情的需要，目前将利用糖皮质激素所具有的强大的抗炎、抗变态反应、抑制免疫及抗肿瘤等药理作用，在一定时期内应用糖皮质激素来治疗您的疾病，达到控制临床症状，减轻病情活动的目的。但其在治疗疾病的同时存在有可能出现的不良反应，或由于已知或未知的原因不能达到预期结果，因此，医生会掌握适应症和禁忌症，但不能对最终疗效作出任何保证。您有权知道应用糖皮质激素治疗目的、存在的风险、预期的效果或对人体的影响。在没有给予您知情并获得您签署的书面同意前，医生不能对您进行糖皮质激素系统治疗。在治疗实施前的任何时间，您都有权接受或拒绝本次治疗。

3 糖皮质激素治疗不良反应

3.1 长期大量应用引起的不良反应

(1) 类肾上腺皮质功能亢进综合征：因物质代谢和水盐代谢紊乱所致，如满月脸、水牛背、向心性肥胖、皮肤变薄、痤疮、多毛、紫纹、浮肿、低血钾、高血压、高血糖等。停药后多可自行消退。

(2) 诱发或加重感染：因皮质激素抑制机体防御功能所致。长期应用常可诱发感染或使体内潜在病灶扩散。还可使原来静止的结核病灶扩散、恶化或乙肝病毒爆发。

(3) 消化系统并发症：使胃酸、胃蛋白酶分泌增加，抑制胃粘液分泌，降低胃肠粘膜的抵抗力，故可诱发或加剧胃、十二指肠溃疡，甚至造成消化道出血或穿孔。

(4) 心血管系统并发症：长期应用可引起高血压和动脉粥样硬化。

(5) 骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓等：与激素促进蛋白质分解、抑制其合成及增加钙、磷排泄有关。长期应用可引起骨质疏松，甚至骨无菌性坏死。因抑制生长素分泌和造成负氮平衡，还可影响生长发育。

(6) 精神症状。

3.2 停药反应

(1) 长期应用的病人，若减量过快或突然停药，由于皮质激素的反馈性抑制脑垂体前叶对ACTH的分泌，可引起肾上腺皮质萎缩和机能不全。

(2) 反跳现象 若病情尚未完全控制或病人对激素产生了依赖性，突然停药或减量过快可致原发病的复发或恶化。需加大剂量再行治疗，待症状缓解后再逐渐减量、停药。

3.3 针对上述情况将采取的防范措施

在应用糖皮质激素治疗的同时将酌情给予补钾、补钙、保护胃粘膜等药物以减少低血钾、骨质疏松及胃肠道副作用的发生。同时需定期监测血压、血糖、血常规、电解质及骨密度等，必要时采取对症治疗。请您严格按照按时按剂量服用药物，病情控制后，需在医生的指导下逐渐减量、停药，以避免停药及反跳现象的出现。

4 可供选择的其它治疗方法及相关毒副作用：易感染

5 为了确保您对上述内容的准确理解，在您仔细阅读该知情同意书及做出决定前，医生将会给您解释上述内容。如果您有任何其他疑问，希望您及时告诉您的医生。

您以下的签名表示：

- (1) 您已阅读并理解、得到了有关糖皮质激素治疗的相关信息；
- (2) 您的医生对以上提出的情况向您作了充分的解释；
- (3) 您授权并同意医生为您施行糖皮质激素的治疗。

患者签字：  日期： 2020-01-10 12:15:05

☒患者本人 ☐患者家属 ☐父母 ☐监护人 ☐委托代理人

医生签字：肖浩文 签字时间：2020-01-10 12:13:07