

The study was approved by the ethical committee of the Zibo 148 Hospital, Peking where the informed consent was not required as the research was conducted on anonymized data for which consent from the volunteers have already been obtained.

中国人民解放军第 960 医院淄博院区全身化疗知情同意书

患者姓名:	性别:	年龄:	住院号:
-------	-----	-----	------

疾病介绍和治疗建议:

恶性肿瘤是危害人体健康的疾病,中晚期可发生全身不同器官转移。化疗是恶性肿瘤综合治疗的措施之一,是采用各种不同作用机制的细胞毒性药物联合或单独使用,对肿瘤细胞进行杀灭或抑制其生长,达到控制肿瘤或治愈的目的。多在术前进行新辅助化疗、术后进行辅助化疗、同步放化疗等。用药途径包括静脉途径、动脉介入途径和局部用药如腹腔化疗,胸腔注射,鞘内注射,心包内注射及局部间质注射等。

多数肿瘤经过化疗后,可以达到控制肿瘤或治愈的目的,可以长期无瘤生存;复发后再次进行治疗,预后也较好。但也有少数患者原发化疗耐药,或化疗一定时期后获得性耐药,需进行化疗方案的更改;有些病人需要进行姑息治疗,预后则较差。

化疗药物在发挥抗肿瘤的同时,也对体内正常组织和细胞产生毒副作用,不同组织系统表现各异,严重的可危及生命。

化疗潜在风险和对策:

全身化疗的风险包括但不限于:

- 1.化疗药物过敏,严重可致过敏性休克,甚至死亡;
- 2.骨髓抑制,白细胞降低,严重的可致重症感染、发热、出血,尤其是重要脏器出血,如脑出血、胃出血、肺出血等;
- 3.胃肠道反应,纳食减少、恶心、呕吐、大便稀薄或便秘、腹泻、严重的可致脱水,脱发、静脉炎、口腔粘膜炎症、口腔溃疡;
- 4.肝肾及膀胱功能损害,严重的致肾功能衰竭;
- 5.心脏或肺功能损害,严重的可致肺纤维化、肺功能受损及衰竭;心律失常、心肌缺血、心肌梗死及心脏衰竭;
- 6.化疗药物刺激性较强,易引起药物外渗和外漏,造成静脉炎,局部组织损伤,严重者可引起组织坏死,影响相应功能;其它如药物热等;
- 7.手足综合症,脱发,严重周围及中枢神经受损等;
- 8.全身或局部色素沉着以及其他毒副作用;
- 9.血栓形成(深静脉血栓形成、肺栓塞、脑梗塞、心肌梗死);
- 10.有些患者化疗中及化疗后发生全身及心、脑血管意外而有生命危险;

化疗中由于患者反应较大或者其他原因可能终止化疗,如果化疗效果不佳、病情进展、化疗耐药,则需更换药物;

医生已告知我以上化疗中可发生的一些风险,有些不常见的风险可能没有在此列出,具体出现的化疗反应根据不同病人的情况有所不同,如果我有特殊的问题可与我的医生讨论。我理解任何所用药物都可能产生副作用,严重的甚至危及生命。

患者目前诊断:

医生综合目前的病人的疾病及身体条件等情况,所选择的化疗方案为:

我同意医生提出的化疗方案

患者或家属签名: 签名日期:

医生签名: 签名日期: