

新辅助化疗知情同意书

姓名

住院号

伤可导致肌无力和肌萎缩；自主神经损害可导致膀胱张力减弱，便秘甚至麻痹性肠梗阻；

13. 皮肤反应：常表现为红斑，主要见于手、足，也可发生在臀部、脸部及胸部，可能发生瘙痒、丘疹、色素沉着、溃瘍、甲沟炎及指（趾）甲病变；部分病人可出现手足综合征，表现为麻木、感觉迟钝、感觉异常、麻刺感、无疼痛或疼痛感、皮肤肿胀或红斑、脱屑、水疱或严重的疼痛。

14. 体液潴留：多见于下肢，并可能发展至全身水肿，也有极少数病人发生胸腔积液、腹水、心包积液，毛细血管通透性增加及体重增加；

15. 其他不良反应：发热、头痛、背痛、寒战、肌痛、乏力、咳嗽、鼻炎、出汗和失眠、脱发、影响生育、黏膜炎、口腔溃疡等；

16. 血栓性静脉炎：输入刺激性化疗药物可导致血管壁的损伤，导致血栓形成；

17. 化疗反应过重，需减少药物剂量或更改化疗方案；

18. 化疗效果不佳甚至病情继续进展，需更改治疗方案；

19. 部分患者新辅助化疗达不到预期效果，疾病进展或患者体质下降，可能失去外科手术机会；

20. 各种化疗药物的副反应不尽相同，请参见相关药物说明书；

21. 由于化疗药物具有较强烈的刺激性，使血管通透性增强，或因肢体活动可能使针头脱出，造成化疗药物外渗或外漏于局部组织；

22. 化疗药物外渗、外漏可造成局部组织的严重损伤，如：浅静脉炎、血栓性静脉炎、局部组织坏死甚至肢体伤残等；

23. 根据国际化疗指南原则：持续静脉给药时，输入发泡剂和刺激性强的药物时或不了解药物性质时或不适合周围静脉给药时应选用中心静脉通路，如：PICC、输液港、锁骨下静脉、颈内静脉等；

24. 对于毒性特别大的化疗药物，我们会要求患者选择相对安全的置管方式，如有患者拒绝或不予配合，造成浅静脉局部血管和皮肤损伤、坏死等不良反应，将由个人承担责任。

患者和（或）授权人/家属意见：

1. 我的医生已告知我将要进行的化疗方案、化疗相关的并发症及风险；

2. 对化疗的危险性及可能发生的问题我表示理解，愿意承担相关风险；

3. 经慎重考虑，我同意接受化疗。

患者签名：

签名日期：2020.10.8

患者授权家属签名：

与患者关系：

签名日期：2020.10.8

主治医师签名：

签名日期：2020.10.8

上级医生签名：

签名日期：2020.10.8