

航空总医院

手术知情同意书

【术前检查】左侧，右侧，双侧大隐静脉曲张

【手术指征及禁忌症】静脉曲张保守治疗效果不佳，如不治疗不会自愈，且有加重恶化趋势；检查病人无手术禁忌

【拟行手术名称】1 大隐静脉交通支结扎、曲张静脉剥脱术；2 静脉腔内热消融；3 硬化剂注射闭塞；4 点式剥脱、CHIVA 结扎 手术。

【手术目的】去除病灶，缓解症状，防止静脉血栓、肺栓塞等风险。

【拒绝手术后的可能后果】病情加重，淤积性皮炎、湿疹、感染，深静脉血栓、肺栓塞等。

【术中或术后可能出现的并发症】我理解此手术可能发生的以下风险和医生的对策：

- 1) 术后曲张静脉异位复发、可能会异位再起；手术目的是改善症状。多数病人存在深静脉反流，术后可改善症状，术后复发率很低，但不保证不会复发。
 - 2) 术后遵医嘱不自私去除弹力袜或绷带，否则自负术后可能出现的不良后果。
 - 3) 术后疼痛、脚踝部浮肿、皮肤水泡（过敏性、张力性）、瘀斑、红肿热痛，多数月在1月后消退；手术后1周、2周、1月按来院挂号门诊复查，否则出现任何问题，自行负责。
 - 4) 点状或条索硬结属于病变静脉内血液凝块会在1年内逐步吸收变小；如有溃疡，局部溃疡长期不愈合，色素沉着，影响外观；术后穿戴弹力袜1-3月能减少发生率。
 - 5) 小腿或内踝麻木不适感，术后口服甲钴胺防治麻木。
 - 6) 术后出血、术后感染，包括伤口、肺部感染、泌尿系感染等；
 - 7) 原有的溃疡复发，或者愈合慢。术后伤口积液，脂肪液化，淋巴漏，伤口不愈合。
 - 8) 术后肿胀疼痛有可能时下肢深静脉血栓形成，会发生肺栓塞，有生命危险，需要及时门诊或急诊复查；预防措施为早期下地活动和皮下注射肝素等。
 - 9) 围手术期心、脑血管意外（心梗、脑梗、脑出血等），生命危险；
 - 10) 静脉曲张治疗方式多种，自己通过咨询后确定后可以随时更改或取消，但是一旦签字手术，术后自己承担一切可能风险。术中根据具体情况可能改变手术方式；
 - 11) 手术医师会保证尽心尽力手术，术后的恢复过程中难免会有上述问题。
 - 12) 医疗过程中产生的资料可用于临床教学和医学知识科普发表于网络。
 - 13) 高血压患者术前不停药。任何手术、麻醉和所用药物都有风险，我理解手术医生会认真的手术，但是这不等于医生能担保避免发生任何并发症。手术时间由手术室统一安排，接病人时患者可以及时通知医师以便及时手术。
 - 14) 为防止手术伤口感染，部分病人需行患肢及会阴部备皮，刮除该处皮肤毛发。
- 3、我理解如果我患有高血压、心脏病、糖尿病、肝肾功能不全、静脉血栓等疾病，以上这些风险可能会加大，在术中或术后出现相关的病情加重或心脑血管意外。

手术方式和术后可能发生的问题医师已告知清楚，可能会有手术后并发症，我无疑问。我主动要求手术，愿意承担上述手术后并发症风险，术后不后悔，不会出现医疗纠纷，不医闹。以下签字为

患者本人签字：

右手拇指手印

患者家属：配偶

女儿

紧急情况下联系电话：

签字时间：2023年4月17日13时30分，签字地点：住院部5层病房

经治医师/术者签字：

医师已告知清楚，可能会有手术后并发症，我无疑问。
我主动要求手术，愿意承担上述手术后并发症风险。