

磁共振检查知情同意书

一 绝对禁忌症（以下情况不适合磁共振检查）

- 1、体内装有心脏起搏器、神经刺激器、动脉瘤夹（钛合金除外）、眼球内金属异物、电子植入物等；
- 2、高烧；

二 相对禁忌症（如有以下情况，磁共振检查前请征得医生同意再行扫描）

- 1 体内装有金属异物者（如假牙、避孕环等）；患者进入磁体间可能会导致体内金属物运动或产热造成损伤，金属物亦可产生伪影而影响诊断准确性。
- 2、昏迷、神志不清、精神异常、易发癫痫或严重外伤、幽闭症患者、幼儿及不配合的患者，如确需检查，请在医生或家属监护下，根据情况给予适量镇静剂后进行。
- 3、孕妇和婴儿，如确需检查，请在医生或家属监护下进行。
- 4、体内可能存在金属或石头碎片的外伤史患者。

三 金属物品禁止带进磁体间

铁磁性物体接近静态磁场可能会飞起吸入磁体，这会对站在物体和磁体之间的人员造成伤害，例如：可卸下的假牙、假发、发夹、硬币、眼镜、助听器、手表、首饰、钱包、磁卡（信用卡、银行卡）、钢笔、钥匙、小刀、带金属钩的胸罩、别针、万金油、打火机、金属拉链或纽扣及绝大部分抢救设备。

四 造影剂（钆对比剂）使用注意事项

- 1、既往无造影剂不良反应。
- 2、无严重肾功能不全。
- 3、可能出现不适和不同程度的过敏等不良反应。
 - *轻度不良反应：一过性胸闷，鼻炎、咳嗽、恶心、全身发热、荨麻疹、瘙痒、血管神经性水肿、结膜炎、喷嚏等；
 - *重度不良反应：喉头水肿、反射性心动过速、惊厥、震颤、抽搐、意识丧失、休克等；
 - *迟发性不良反应：肾功能不全患者注射造影剂后可能会引起四肢皮肤的增厚和硬化，最后可造成关节固定和挛缩，甚至可能引起致死性肾源性系统性纤维化。
- 4、注射部位可能出现对比剂漏出，个别患者可能引起皮下对比剂积存，造成皮下组织肿胀、疼痛、麻木感，甚至溃烂、坏死等；极个别患者可能发生非感染性静脉炎。
- 5、使用高压注射器时，存在注射针头脱落、注射部位血管破裂的潜在危险。
- 6、注射部位及全身可能出现其他不能预测的不良反应。
- 7、如果出现不良反应，请及时与相关医师联系。

联系电话：87343214（上班时间）、87343216（下班时间）。

请行上腹部CT、MR检查的患者:在扫描前一周内，不做胃肠道造影检查,不吃含金属成份的药物。在扫描前两天,少吃水果,蔬菜,瘦肉等,无须吃泻药。扫描前4小时禁食不禁水。

我已仔细阅读和理解以上内容，遵守上述规定，同意进行该项检查。

患者签名:

与患者关系: 本人

日期: 2020 年 6 月 13 日

磁共振检查知情同意书

一 绝对禁忌症（以下情况不适合磁共振检查）

- 1、体内装有心脏起搏器、神经刺激器、动脉瘤夹（钛合金除外）、眼球内金属异物、电子植入物等；
- 2、高烧；

二 相对禁忌症（如有以下情况，磁共振检查前请征得医生同意再行扫描）

- 1 体内装有金属异物者（如假牙、避孕环等）；患者进入磁体间可能会导致体内金属物运动或产热造成损伤，金属物亦可产生伪影而影响诊断准确性。
- 2、昏迷、神志不清、精神异常、易发癫痫或严重外伤、幽闭症患者、幼儿及不配合的患者，如确需检查，请在医生或家属监护下，根据情况给予适量镇静剂后进行。
- 3、孕妇和婴儿，如确需检查，请在医生或家属监护下进行。
- 4、体内可能存在金属或石头碎片的外伤史患者。

三 金属物品禁止带进磁体间

铁磁性物体接近静态磁场可能会飞起吸入磁体，这会对站在物体和磁体之间的人员造成伤害，例如：可卸下的假牙、假发、发夹、硬币、眼镜、助听器、手表、首饰、钱包、磁卡（信用卡、银行卡）、钢笔、钥匙、小刀、带金属钩的胸罩、别针、万金油、打火机、金属拉链或纽扣及绝大部分抢救设备。

四 造影剂（钆对比剂）使用注意事项

- 1、既往无造影剂不良反应。
- 2、无严重肾功能不全。
- 3、可能出现不适和不同程度的过敏等不良反应。

*轻度不良反应：一过性胸闷，鼻炎、咳嗽、恶心、全身发热、荨麻疹、瘙痒、血管神经性水肿、结膜炎、喷嚏等；

*重度不良反应：喉头水肿、反射性心动过速、惊厥、震颤、抽搐、意识丧失、休克等；

*迟发性不良反应：肾功能不全患者注射造影剂后可能会引起四肢皮肤的增厚和硬化，最后可造成关节固定和挛缩，甚至可能引起致死性肾源性系统性纤维化。

4、注射部位可能出现对比剂漏出，个别患者可能引起皮下对比剂积存，造成皮下组织肿胀、疼痛、麻木感，甚至溃烂、坏死等；极个别患者可能发生非感染性静脉炎。

5、使用高压注射器时，存在注射针头脱落、注射部位血管破裂的潜在危险。

6、注射部位及全身可能出现其他不能预测的不良反应。

7、如果出现不良反应，请及时与相关医师联系。

联系电话：87343214（上班时间）、87343216（下班时间）。

请行上腹部CT、MR检查的患者:在扫描前一周内，不做胃肠道造影检查,不吃含金属成份的药物。在扫描前两天,少吃水果,蔬菜,瘦肉等,无须吃泻药。扫描前4小时禁食不禁水。

我已详细阅读和理解以上内容，遵守上述规定，同意进行该项检查。

患方签名：

与患者关系： 本人

日期： 2020 年 8 月 8 日

磁共振检查知情同意书

一 绝对禁忌症（以下情况不适合磁共振检查）

- 1、体内装有心脏起搏器、神经刺激器、动脉瘤夹（钛合金除外）、眼球内金属异物、电子植入物等；
- 2、高烧；

二 相对禁忌症（如有以下情况，磁共振检查前请征得医生同意再行扫描）

- 1 体内装有金属异物者（如假牙、避孕环等）；患者进入磁体间可能会导致体内金属物运动或产热造成损伤，金属物亦可产生伪影而影响诊断准确性。
- 2、昏迷、神志不清、精神异常、易发癫痫或严重外伤、幽闭症患者、幼儿及不配合的患者，如确需检查，请在医生或家属监护下，根据情况给予适量镇静剂后进行。
- 3、孕妇和婴儿，如确需检查，请在医生或家属监护下进行。
- 4、体内可能存在金属或石头碎片的外伤史患者。

三 金属物品禁止带进磁体间

铁磁性物体接近静态磁场可能会飞起吸入磁体，这会对站在物体和磁体之间的人员造成伤害，例如：可卸下的假牙、假发、发夹、硬币、眼镜、助听器、手表、首饰、钱包、磁卡（信用卡、银行卡）、钢笔、钥匙、小刀、带金属钩的胸罩、别针、万金油、打火机、金属拉链或纽扣及绝大部分抢救设备。

四 造影剂（钆对比剂）使用注意事项

- 1、既往无造影剂不良反应。
- 2、无严重肾功能不全。
- 3、可能出现不适和不同程度的过敏等不良反应。
 - *轻度不良反应：一过性胸闷，鼻炎、咳嗽、恶心、全身发热、荨麻疹、瘙痒、血管神经性水肿、结膜炎、喷嚏等；
 - *重度不良反应：喉头水肿、反射性心动过速、惊厥、震颤、抽搐、意识丧失、休克等；
 - *迟发性不良反应：肾功能不全患者注射造影剂后可能会引起四肢皮肤的增厚和硬化，最后可造成关节固定和挛缩，甚至可能引起致死性肾源性系统性纤维化。
- 4、注射部位可能出现对比剂漏出，个别患者可能引起皮下对比剂积存，造成皮下组织肿胀、疼痛、麻木感，甚至溃烂、坏死等；极个别患者可能发生非感染性静脉炎。
- 5、使用高压注射器时，存在注射针头脱落、注射部位血管破裂的潜在危险。
- 6、注射部位及全身可能出现其他不能预测的不良反应。
- 7、如果出现不良反应，请及时与相关医师联系。

联系电话：87343214（上班时间）、87343216（下班时间）。

请行上腹部CT、MR检查的患者:在扫描前一周内，不做胃肠道造影检查,不吃含金属成份的药物。在扫描前两天,少吃水果,蔬菜,瘦肉等,无须吃泻药。扫描前4小时禁食不禁水。

我已仔细阅读和理解以上内容，遵守上述规定，同意进行该项检查。

患方签名：

与患者关系： 本人

日期： 2020 年 5 月 29 日