

中国人民解放军第二炮兵总医院

特殊诊疗同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 女 年龄: 59岁 科室: 消化内科病区 床号: [REDACTED] 住院号: [REDACTED] 单位: 无

临床诊断: 自身免疫性胰腺炎

诊疗名称: 使用糖皮质激素

诊疗日期: 2017-04-21

可能出现的意外和并发症: 由于医学科学的特殊性和个体差异, 在检查和手术过程中及后期, 有可能出现:

长期应用可引起一系列不良反应, 其严重程度与用药剂量及用药时间成正比, 主要有:

1. 医源性库欣综合征, 如向心性肥胖、满月脸、皮肤紫纹淤斑、类固醇性糖尿病(或已有糖尿病加重)、骨质疏松、自发性骨折甚或骨坏死(如股骨头无菌性坏死)、女性多毛月经紊乱或闭经不孕、男性阳萎、出血倾向等。
2. 诱发或加重细菌、病毒和真菌等各种感染。
3. 诱发或加剧胃十二指肠溃疡, 甚至造成消化道大出血或穿孔。
4. 高血压、充血性心力衰竭和动脉粥样硬化、血栓形成。
5. 高脂血症, 尤其是高甘油三酯血症。
6. 肌无力、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓。
7. 激素性青光眼、激素性白内障。
8. 精神症状如焦虑、兴奋、欣快或抑郁、失眠、性格改变, 严重时可诱发精神失常、癫痫发作。
9. 儿童长期应用影响生长发育。
10. 长期外用糖皮质激素类药物可出现局部皮肤萎缩变薄、毛细血管扩张、色素沉着、继发感染等不良反应; 在面部长期外用时, 可出现口周皮炎、酒渣鼻样皮损等。
11. 吸入型糖皮质激素的不良反应包括声音嘶哑、咽部不适和念珠菌定植、感染。长期使用较大剂量吸入型糖皮质激素者也可能出现全身不良反应。

谈话医师: 姓名 [REDACTED]
2017-04-21

患者本人或亲属意见: 经慎重考虑, 同意检查治疗。对以上可能发生的意外和并发症明知。如发生上述情况, 表示理解。

患者本人签名:

代签人与患者的关系: 母女

签字人单位:

签字人身份证号码:

代签人签名 [REDACTED]

2017-04-21

