

Case1 VRD regimens (Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethsone)

首都医科大学附属 北京朝阳医院 侵入性检查知情同意书

一、检查目的：
了解骨髓造血功能和病理变化，诊断或除外血液系统疾病。

二、检查的适应症：
☐ 原因不明的发热、感染疾；
☐ 原因不明的肝、脾、淋巴结肿大；
☐ 周围血出现幼稚细胞、可疑细胞、形态异常细胞；
☐ 血细胞的单项或多项原因不明的减少或增多；
☐ 原因不明的青紫、骨折；
☐ 原因不明的出血倾向或血栓形成；
☐ 其它。

三、本项检查经过多年的临床实践及广泛应用已证实有较高的安全性，以成为常规检查/治疗项目，只要患者和医生配合，一般均能顺利完成，但因病人健康状况、个体差异及某些不可预测的因素，在接受检查时可能出现下列情况：
1. 局部疼痛；2. 局部感染；3. 局部出血；4. 胸骨穿到有可能损伤深部大血管，引起大出血；5. 其它。
以上所述是在正常操作过程中可能出现的意外并发症；如实介绍和了解此内容，是医生和病人及家属共同责任。

四、出现上述各种并发症的治疗对策：
此项检查的执行医生应按医疗操作规则认真准备，仔细观察和操作，最大限度地避免所述并发症的发生。
上述并发症出现后，我们会立即采取相应措施，对危及生命的并发症处理的同时向家属紧急征求意见，可能来不及征求家属意见，需要紧急输血、深静脉置管、心肺按压、电除颤等抢救生命的紧急措施，希望得到家属的理解。

五、检查费用：交纳所需费用是接受此项检查/治疗的基本条件，患者或家属应履行正常的交费手续。
☐ 社会基本医疗保险 ☐ 公费医疗 ☐ 大病统筹 ☐ 商业医疗保险 ☐ 自费 ☐ 其它

六、患者、家属意见：患者或家属对侵入性检查知情同意书中内容有了全面了解，获同意由贵科施行该项检查/治疗，并望医师及相关人员恪尽职守，尽治疗之责任，执行好此次检查。若在执行检查期间发生意外紧急情况，同意接受贵科的必要处理。

患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家庭住址：_____
医生签字：_____
签字日期：2019年06月04日10时39分

首都医科大学附属 北京朝阳医院 血液肿瘤化疗知情同意书

治疗项目：化疗

一、治疗目的：
为使疾病得到有效控制必须进行治疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题：
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾；
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血；
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用；
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命；
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；
7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可造成化疗药达不到其应有的治疗效果，而毒副作用加重；
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。

三、患者、家属意见：
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字：
患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家庭住址：_____
医生签字：_____
签字日期：2019年06月04日10时39分

首都医科大学附属 北京朝阳医院 血液肿瘤化疗知情同意书

临床诊断：淋巴瘤

治疗项目：化疗

一、治疗目的：
为使疾病得到有效控制必须进行治疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题：
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾；
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血；
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用；
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命；
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；
7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可造成化疗药达不到其应有的治疗效果，而毒副作用加重；
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。

三、患者、家属意见：
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字：
患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家庭住址：_____
医生签字：_____
签字日期：2019年06月27日16时08分

Case1 VRD regimens (Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethsone)

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹内或消化道黏膜糜烂、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药不良反应耐受或耐药患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重。 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：____ 签字日期：2019年07月18日10时25分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹内或消化道黏膜糜烂、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药不良反应耐受或耐药患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重。 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：____ 签字日期：2019年08月20日16时14分

Case 2 BAD regimens (Bortezomib,Doxorubicin and Dexamethsone)

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;

2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;

3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血;

4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、血液麻木或衰竭、糖尿病、不孕或不育等副作用;

5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;

6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;

7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;

8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: _____, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: _____ 签字日期: 2019年05月14日09时57分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外浆细胞瘤 骨质破坏 上颌窦炎 慢性乙型病毒性肝炎 肝血管瘤 肝囊肿 甲状腺术后 胆结石 手指感染

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;

2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;

3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血;

4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、血液麻木或衰竭、糖尿病、不孕或不育等副作用;

5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;

6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;

7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;

8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: _____, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: _____ 签字日期: 2019年06月11日15时59分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断: 多发性骨髓瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;

2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;

3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血;

4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、血液麻木或衰竭、糖尿病、不孕或不育等副作用;

5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;

6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;

7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;

8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: _____, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: _____ 签字日期: 2019年07月08日12时14分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京 朝阳医院

临床诊断: 多发性骨髓瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;

2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;

3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道粘膜溃疡、出血;

4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、血液麻木或衰竭、糖尿病、不孕或不育等副作用;

5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;

6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;

7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;

8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: _____, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: _____ 签字日期: 2019年08月14日08时22分

Case 2 BAD regimens (Bortezomib,Doxorubicin and Dexamethsone)

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤、髓外浆细胞瘤、骨髓破坏
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或黏膜出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，耐药副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：李俊 签字日期：2019年09月11日10时26分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或黏膜出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，耐药副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：李俊 签字日期：2019年09月11日10时26分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或黏膜出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，耐药副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：李俊 签字日期：2019年11月14日10时47分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤、髓外浆细胞瘤、骨髓破坏、上颌窦炎、慢性乙型病毒性肝炎
治疗项目：化疗
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或黏膜出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果，耐药副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：____，家属签字：____ 家属与患者关系：____，家属联系方式：____ 家属地址：____ 医生签字：李俊 签字日期：2019年12月18日15时50分

Case3 T-CAD regimens (Thalidomide/ Ifosfamide/Epirubicin/Dexamethsone); BAD regimens (Bortezomib ,Epirubicin and Dexamethsone).

首都医科大学 北京朝阳医院	
血液肿瘤化疗知情同意书	
临床诊断：多发性骨髓瘤 IgG 型 DS 分期 II 期 ISS 分期 II 期 髓外浸润	
治疗项目：化疗	
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。	
二、化疗过程中有可能发生下列问题：	
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾；	
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；	
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血；	
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用；	
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命；	
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；	
7 少数患者由于对化疗药过敏或耐药而对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重。	
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。	
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解	
患者签字：_____	_____
家属与患者关系：_____	_____
家属地址：_____	_____
医生签字：_____	签字日期：2013 年 10 月 28 日

首都医科大学 北京朝阳医院	
血液肿瘤化疗知情同意书	
临床诊断：多发性骨髓瘤 髓外浸润	
治疗项目：化疗	
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行的治疗。	
二、化疗过程中有可能发生下列问题：	
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残疾；	
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；	
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血；	
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用；	
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命；	
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；	
7 少数患者由于对化疗药过敏或耐药而对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重。	
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。	
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字。	
患者签字：_____	家属签字：_____
家属与患者关系：_____	家属联系方式：_____
家属地址：_____	_____
医生签字：_____	签字日期：2013 年 11 月 19 日

Case 4 T-CAD regimen(thalidomide,ifosfamide,Epirubicin and Dexamethsone)

首都医科大学附属北京朝阳医院 血液肿瘤化疗知情同意书	
临床诊断：多发性骨髓瘤 恶性肿瘤化疗后的随访检查	
治疗项目：化疗	
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行治疗。	
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残废； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肾脏、肝脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药过敏反应或对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。	
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处置，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：_____, 家属签字：_____ 家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____ 联系地址：_____ 医生签字：_____, 签字日期：2013年 11月 13日	

首都医科大学附属北京朝阳医院 血液肿瘤化疗知情同意书	
临床诊断：多发性骨髓瘤 恶性肿瘤化疗后的随访检查	
治疗项目：化疗	
一、治疗目的： 为使疾病得到有效控制必须进行治疗。	
二、化疗过程中有可能发生下列问题： 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体残废； 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命； 3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血； 4 化疗药物可影响心脏、肾脏、肝脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用； 5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者造成感染性休克而危及生命； 6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命； 7 少数患者由于对化疗药过敏反应或对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而毒副作用加重； 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。	
三、患者、家属意见： 上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处置，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字： 患者签字：_____, 家属签字：_____ 家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____ 联系地址：_____ 医生签字：_____, 签字日期：2013年 12月 10日	

Case 5

In July and Aug. 2013, T-CAD regimens(Thalidomide/ Ifosfamide/Epirubicin/Dexamethsone);
In Jan. and Feb. 2014, BAD regimens(Bortezomib ,Epirubicin and Dexamethsone;
In March 2014, B-CEVAD regimens (Bortezomib,Etoposide,ifosfamide, Vindesine sulfate , Epirubicin,and Dexamethsone).

53:1234/Main.aspx

血液肿瘤化疗知情同意书

北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤

治疗项目：化疗

一、治疗目的：
为使疾病得到有效控制必须进行化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题：
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体坏死；
2 部分患者在化疗过程中可发生过敏反应，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起脱水或消化道黏膜溃疡、出血；
4 化疗药物可影响心脏、肝、肾、胃脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用；
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者可造成感染性休克而危及生命；
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；
7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而副作用加重；
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。

三、患者、家属意见：
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字：
患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家属地址：_____
医生签字：_____, 签字日期：2013年12月23日

53:1234/Main.aspx

血液肿瘤化疗知情同意书

北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤 IgG × 型 IIb 期 髓外病变（左乳腺，卵巢，左乳腺） 左乳腺髓外浸润

治疗项目：化疗

一、治疗目的：
为使疾病得到有效控制必须进行化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题：
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体坏死；
2 部分患者在化疗过程中可发生过敏反应，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起脱水或消化道黏膜溃疡、出血；
4 化疗药物可影响心脏、肝、肾、胃脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用；
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者可造成感染性休克而危及生命；
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；
7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而副作用加重；
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。

三、患者、家属意见：
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字：
患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家属地址：_____
医生签字：_____, 签字日期：2013年12月23日

首都医科大学 血液肿瘤化疗知情同意书

北京朝阳医院

临床诊断：多发性骨髓瘤 IgG × 型 IIb 期 髓外病变（左乳腺） 髓外浆细胞瘤（左乳腺，卵巢，左乳腺）

治疗项目：化疗

一、治疗目的：
为使疾病得到有效控制必须进行化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题：
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用，化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死，严重者引起肢体坏死；
2 部分患者在化疗过程中可发生过敏反应，引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克，危及生命；
3 大多化疗药有胃肠道反应，化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状，严重者引起脱水或消化道黏膜溃疡、出血；
4 化疗药物可影响心脏、肝、肾、胃脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能，引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用；
5 化疗后可发生严重骨髓抑制，造成白细胞减少，免疫功能低下，引起发热、感染或败血症，严重者可造成感染性休克而危及生命；
6 化疗后可发生血小板减少，引起皮肤、内脏或脑出血，严重者危及生命；
7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗，可造成化疗药未达到其应有的治疗效果，而副作用加重；
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外，甚至危及生命。

三、患者、家属意见：
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属，虽经积极预防和处理，有些化疗不良反应仍不可避免，如家属表示理解并同意化疗，请签字：
患者签字：_____, 家属签字：_____
家属与患者关系：_____, 家属联系方式：_____
家属地址：_____
医生签字：_____, 签字日期：2013年12月23日

Case 6

In July 2014, T-CAD regimen(Bortezomib ,Epirubicin and Dexamehsone);

In Dec. 2014 and Jan. 2015 , BAD regimens (Ifosfamide,Epirubicin and Dexamehsone);

恶性血液肿瘤化疗知情同意书

临床诊断: [REDACTED]

治疗项目: [REDACTED]

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行治疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1. 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残疾;
2. 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
3. 多数化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4. 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5. 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
6. 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
7. 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药达不到应有的治疗效果,而毒副作用加重;
8. 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: [REDACTED] 家属签字: [REDACTED]
家属与患者关系: [REDACTED] 家属联系方式: [REDACTED]
家属地址: [REDACTED]
医生签字: [REDACTED] 签字日期: 2014年 7月 31日

恶性血液肿瘤化疗知情同意书

临床诊断: [REDACTED]

治疗项目: [REDACTED]

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行治疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1. 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残疾;
2. 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
3. 多数化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4. 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5. 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
6. 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
7. 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药达不到应有的治疗效果,而毒副作用加重;
8. 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: [REDACTED] 家属签字: [REDACTED]
家属与患者关系: [REDACTED] 家属联系方式: [REDACTED]
家属地址: [REDACTED]
医生签字: [REDACTED] 签字日期: 2014年 8月 26日

恶性血液肿瘤化疗知情同意书

临床诊断: [REDACTED]

治疗项目: [REDACTED]

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行治疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1. 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残疾;
2. 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
3. 多数化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4. 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5. 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
6. 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
7. 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可造成化疗药达不到应有的治疗效果,而毒副作用加重;
8. 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: [REDACTED] 家属签字: [REDACTED]
家属与患者关系: [REDACTED] 家属联系方式: [REDACTED]
家属地址: [REDACTED]
医生签字: [REDACTED] 签字日期: 2014年 9月 16日

Case 6

In July 2014 ,T-CAD regimen(Thalidomide, Ifosfamide,Epirubicin and Dexamethsone);
In Dec. 2014 and Jan. 2015 , BAD regimen(BortezomibEpirubicin and Dexamethsone).

北京朝阳医院 恶性血液肿瘤化疗知情同意书

病案号: J10074601

姓名	袁晓俊	性别	女	年龄	40	科别	血液	床号	404
----	-----	----	---	----	----	----	----	----	-----

临床诊断: M1a

治疗项目:

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
- 3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
- 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:

上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: 袁晓俊 家属签字: _____

家属与患者关系: _____ 家属联系方式: _____

家属地址: _____

医生签字: 袁晓俊 签字日期: 2014年 10月 13日

MR-355

北京朝阳医院 恶性血液肿瘤化疗知情同意书

病案号: J10074601

姓名	袁晓俊	性别	女	年龄	40	科别	血液	床号	404
----	-----	----	---	----	----	----	----	----	-----

临床诊断: M1a

治疗项目:

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
- 3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
- 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:

上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: 袁晓俊 家属签字: _____

家属与患者关系: _____ 家属联系方式: _____

家属地址: _____

医生签字: 袁晓俊 签字日期: 2014年 11月 12日

MR-355

首都医科大学附属 北京朝阳医院 恶性血液肿瘤化疗知情同意书

病案号: J10074601

姓名	袁晓俊	性别	女	年龄	40	科别	血液	床号	404
----	-----	----	---	----	----	----	----	----	-----

临床诊断: M1a

治疗项目:

一、手术目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
- 3 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状,严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等器官和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或震颤、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克而危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或脑出血,严重者危及生命;
- 7 少数患者由于对化疗药原发耐药或对高危患者的化疗,可能造成化疗药未达到其应有的治疗效果,而毒副作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:

上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: 袁晓俊 家属签字: _____

家属与患者关系: _____ 家属联系方式: _____

家属地址: _____

医生签字: 袁晓俊 签字日期: 2014年 1月 26日

MR-355

Case 7

In April and May 2019, CAD regimens (Cyclophosphamide, Pirarubicin and Dexamethsone); From June to Aug. 2019, R-DECP regimen (lenalidomide, Cisplatin, Etoposide, Cyclophosphamide and Prednisone).

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院 (第 1 页) ID号: T190481895 病案号: J20120481

姓名: 郭爱敏 性别: 女 年龄: 38岁 科别: 血液科 床号: X405

临床诊断: 多发性骨髓瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使病情得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用, 化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
3 大多化疗药有胃肠道反应, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状, 严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或腰痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克而危及生命;
6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏或颅内出血, 严重者危及生命;
7 少数患者由于对化疗药深过敏反应或过敏原患者的化疗, 可造成化疗药达不到其应有的治疗效果, 而毒副作用加重;
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭爱敏, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: 李华, 签字日期: 2019年04月11日10时30分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院 (第 1 页) ID号: T190481895 病案号: J20120481

姓名: 郭爱敏 性别: 女 年龄: 38岁 科别: 血液科 床号: X401

临床诊断: 多发性骨髓瘤 化疗 多发性骨髓瘤 髓外浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使病情得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用, 化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
3 大多化疗药有胃肠道反应, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状, 严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或腰痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克而危及生命;
6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏或颅内出血, 严重者危及生命;
7 少数患者由于对化疗药深过敏反应或过敏原患者的化疗, 可造成化疗药达不到其应有的治疗效果, 而毒副作用加重;
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭爱敏, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: 李华, 签字日期: 2019年04月29日18时03分

首都医科大学附属 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院 (第 1 页) ID号: T190481895 病案号: J20120481

姓名: 郭爱敏 性别: 女 年龄: 38岁 科别: 血液科 床号: X404

临床诊断: 多发性骨髓瘤 化疗 多发性骨髓瘤 髓外浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使病情得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列问题:
1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用, 化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
3 大多化疗药有胃肠道反应, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症状, 严重者引起腹泻或消化道黏膜溃疡、出血;
4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或腰痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克而危及生命;
6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏或颅内出血, 严重者危及生命;
7 少数患者由于对化疗药深过敏反应或过敏原患者的化疗, 可造成化疗药达不到其应有的治疗效果, 而毒副作用加重;
8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭爱敏, 家属签字: _____
家属与患者关系: _____, 家属联系方式: _____
家属地址: _____
医生签字: 李华, 签字日期: 2019年05月20日15时59分

Case 7 In April and May 2019,CAD regimens(Cyclophosphamide,Pirubicin and Dexamethsone);
From June to Aug. 2019,R-DECP regimen (lenalidomide ,Cisplatin,Etoposide,Cyclophosphamide and Prednisone).

首都医科大学附属医院 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院
(第 1 页) ID号: T190481605 病案号: 12013849

姓名	郭安敏	性别	女	年龄	38岁	科室	血液科	病号	X423
----	-----	----	---	----	-----	----	-----	----	------

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外的浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列风险:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用。化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
- 3 大多化疗药有骨髓抑制, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等反应, 严重者引起腹泻或消化道溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏出血, 严重者危及生命;
- 7 少数患者由于化疗药物代谢对高危患者的化疗, 可能造成化疗药达到其应有的治疗效果、副作用作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭安敏, 家属签字: 郭爱敏
家属与患者关系: 女儿, 家属联系方式: 13910991655
家属地址: 北京市朝阳区
医生签字: 李中, 签字日期: 2019年08月10日09时55分

首都医科大学附属医院 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院
(第 1 页) ID号: T190481605 病案号: 12013849

姓名	郭爱敏	性别	女	年龄	38岁	科室	血液科	病号	X401
----	-----	----	---	----	-----	----	-----	----	------

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外的浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列风险:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用。化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
- 3 大多化疗药有骨髓抑制, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等反应, 严重者引起腹泻或消化道溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏出血, 严重者危及生命;
- 7 少数患者由于化疗药物代谢对高危患者的化疗, 可能造成化疗药达到其应有的治疗效果、副作用作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭爱敏, 家属签字: 郭爱敏
家属与患者关系: 女儿, 家属联系方式: 13910991655
家属地址: 北京市朝阳区
医生签字: 李中, 签字日期: 2019年07月17日15时09分

首都医科大学附属医院 血液肿瘤化疗知情同意书
北京朝阳医院
(第 1 页) ID号: T190481605 病案号: 12013849

姓名	郭爱敏	性别	女	年龄	38岁	科室	血液科	病号	X424
----	-----	----	---	----	-----	----	-----	----	------

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外的浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:
为使疾病得到有效控制必须进行的化疗。

二、化疗过程中有可能发生下列风险:

- 1 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用。化疗药可能引起局部静脉炎或皮肤坏死, 严重者引起肢体残废;
- 2 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏, 引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克, 危及生命;
- 3 大多化疗药有骨髓抑制, 化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等反应, 严重者引起腹泻或消化道溃疡、出血;
- 4 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能, 引起心律失常或心脏骤停、肝肾功能异常、四肢麻木或酸痛、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 5 化疗后可发生严重骨髓抑制, 造成白细胞减少, 免疫功能低下, 引起发热、感染或败血症, 严重者造成感染性休克危及生命;
- 6 化疗后可发生血小板减少, 引起皮肤、内脏出血, 严重者危及生命;
- 7 少数患者由于化疗药物代谢对高危患者的化疗, 可能造成化疗药达到其应有的治疗效果、副作用作用加重;
- 8 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外, 甚至危及生命。

三、患者、家属意见:
上述有关化疗的各种不良反应已告知家属, 虽经积极预防和处理, 有些化疗不良反应仍不可避免。如家属表示理解并同意化疗, 请签字:
患者签字: 郭爱敏, 家属签字: 郭爱敏
家属与患者关系: 女儿, 家属联系方式: 13910991655
家属地址: 北京市朝阳区
医生签字: 李中, 签字日期: 2019年08月10日17时01分

Case 7

From April to Tuly 2019,CAD regimens(Cyclophosphamide,Pirubicin and Dexamethsone)*6 cycles;
From Aug. to Oct.2019,R-DECP regimens (lenalidomide ,Cisplatin,Etoposide,Cyclophosphamide and Prednisone);
In Nov.2019,BED regimen((Bortezomib, Etoposide and Dexamethsone)

1234/Main.aspx

血液肿瘤化疗知情同意书

北京朝阳医院

姓名: 郭爱军 性别: 女 年龄: 39岁 科室: 血液科 床号: X405

临床诊断: 多发性骨髓瘤 髓外浆细胞瘤

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:

为使疾病得到有效控制而进行的治疗。

二、化疗过程中可能发生下列问题:

- 由于化疗药物对骨髓皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体坏死;
- 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
- 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症,严重者引起脱水或消化道黏膜炎、出血;
- 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克危及生命;
- 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或黏膜出血,严重者危及生命;
- 少数患者由于对化疗药过敏反应或对其患者的化疗,可能造成化疗药达不到其应有的治疗效果,而副作用加重;
- 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:

上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: 郭爱军 家属签字: _____

医生签字: _____ 签字日期: 2019年09月24日16时25分

首都医科大学 血液肿瘤化疗知情同意书

北京朝阳医院

姓名: 郭爱军 性别: 女 年龄: 39岁 科室: 血液科 床号: X405

临床诊断:

治疗项目: 化疗

一、治疗目的:

为使疾病得到有效控制而进行的治疗。

二、化疗过程中可能发生下列问题:

- 由于化疗药物对局部皮肤、血管有刺激作用,化疗药可引起局部静脉炎或皮肤坏死,严重者引起肢体坏死;
- 部分患者在化疗过程中可发生药物过敏,引起皮疹、发热、胸闷、甚至造成过敏性休克,危及生命;
- 大多化疗药有胃肠道反应,化疗期间患者可出现食欲不振、恶心、呕吐等症,严重者引起脱水或消化道黏膜炎、出血;
- 化疗药物可影响心脏、肝脏、肾脏等脏器和中枢神经系统、内分泌系统、生殖系统等系统的功能,引起心律失常或心脏骤停、肾功能异常、四肢麻木或瘫痪、糖尿病、不孕或不育等副作用;
- 化疗后可发生严重骨髓抑制,造成白细胞减少,免疫功能低下,引起发热、感染或败血症,严重者造成感染性休克危及生命;
- 化疗后可发生血小板减少,引起皮肤、内脏或黏膜出血,严重者危及生命;
- 少数患者由于对化疗药过敏反应或对其患者的化疗,可能造成化疗药达不到其应有的治疗效果,而副作用加重;
- 化疗过程中可能出现罕见的或不可预测的意外,甚至危及生命。

三、患者、家属意见:

上述有关化疗的各种不良反应已告知家属,虽经积极预防和处理,有些化疗不良反应仍不可避免,如家属表示理解并同意化疗,请签字:

患者签字: 郭爱军 家属签字: _____

医生签字: 王全 签字日期: 2019年11月22日09时55分