

安徽省立医院南区影像中心

影像检查告病人通知单

患者及家属：你们好！您拟行的增强 CT、CTA、静脉肾盂造影、子宫输卵管造影需要用含碘造影剂，此项检查有些禁忌症，并可能发生碘过敏反应，不同类型的过敏反应难以预测；磁共振检查有些绝对禁忌症，增强 MRI 及 CE-MRA 偶见过敏反应。请您认真阅读、确认后签字，检查时有家属陪同。谢谢合作！

一、含碘造影剂检查禁忌症及碘过敏反应：

1.禁忌症：碘过敏试验阳性、重度甲状腺机能亢进、严重心、肾功能不全等。

2.碘过敏反应：轻者出现头痛、恶心、呕吐、荨麻疹、面色潮红、胸闷等；重者出现血压下降、喉头水肿、呼吸困难、过敏性休克甚至危及生命等。

二、磁共振检查禁忌症：

1.带有心脏起搏器者。2.曾做心脏手术，有人工心脏瓣膜或支架者。3.带有骨骼生长刺激器和神经刺激器或耳蜗移植体者。4.带有某些假体（义眼、人工关节）者。5.体内金属异物（如眼球金属异物、大血管旁的金属异物、金属避孕环、金属内固定板、吻合器及金属夹等）。6.石膏固定的患者。7.妊娠三月期妇女。8.需要心电监护仪、人工呼吸机维持生命体征的危重患者。9.幽闭恐惧症患者。

三、磁共振造影剂过敏反应：

磁共振造影剂经肾脏代谢，很少发生全身性副反应，少数患者可能出现不良反应，如头晕、头疼、呕吐、皮肤潮红、皮疹、胸闷、呼吸急促等，出现重度过敏反应（呼吸抑制、心跳骤停）约二十万分之一。

同志，拟于 月 日在影像中心行（增强 CT、CTA、静脉肾盂造影、子宫输卵管造影、磁共振）检查，本人及家属意见（请填写同意或不同意见）。

温馨提示：1.凡行增强 CT 或 CTA 检查，静脉注射含碘造影剂半小时后，确无明显不适反应，拔出留置针后，方可离去。2.凡经高压注射器静脉注药者，可能致造影剂渗漏及静脉损伤。

患者本人意见：

家属意见（与患者关系

签名：

签

影像中心

2021 年

日

