

介入知情同意书

上海市第十人民医院
同济大学附属第十人民医院
SHANGHAI TENTH PEOPLE'S HOSPITAL
TENTH PEOPLE'S HOSPITAL OF TONGJI UNIVERSITY



姓名: 性别: 年龄: 科室: 床号: 住院号:

谈话时间: 2021-08-31 09:17

谈话内容: 接受子宫肌瘤栓塞术治疗虽经术前认真检查治疗准备, 但可能发生以下并发症或意外情况。

1. 局麻药反应;
2. 造影剂不良反应, 如: 皮疹, 肾功能损害、肾功能衰竭, 需要透析治疗; 严重出现过敏性休克、死亡;
3. 穿刺部位出血、血肿、疼痛、感染;
4. 发现血管变异, 或其他病变, 需更改手术方式;
5. 动脉血栓形成, 血栓或粥样斑块脱落, 动脉夹层, 血管痉挛等, 造成非靶器官缺血性坏死, 如下肢、肠道、肾、脑、肺等;
6. 血管破裂, 动脉夹层, 夹层动脉瘤破裂, 脑出血, 出血性休克, 肢体残疾甚至死亡;
7. 静脉血栓形成, 靶器官静脉回流障碍, 如下肢肿胀、疼痛等, 血栓脱落致肺动脉栓塞、肺动脉高压、心功能不全, 严重者有猝死可能;
8. 器材意外, 包括导管及导丝打折、成袢、断裂, 滤器及支架移位、断裂、移位, 甚至需要手术解决;
9. 栓塞并发症: 其他正常组织器官缺血坏死, 栓塞不完全, 瘤体继续增大、破裂出血; 栓塞后综合症: 组织缺血坏死, 器官功能损害, 缺血性炎症, 继发感染;
10. 器官缺血再灌注损伤, 如下肢肿胀, 骨筋膜室综合症, 肾功能损害等;
11. 心脑血管意外及重要脏器功能衰竭;
12. 化疗药物相关副反应见化疗知情同意书;
13. 患者替代治疗方案, 如如产科手术切除及保守治疗。
14. 介入治疗后可能出现盆腔积液, 局部疼痛, 阴道不规则流血等术后副反应, 严重时可能行对症治疗。
15. 患者介入治疗后子宫肌瘤消退可能缓慢, 至少6月后可见。不能确定对后期怀孕的影响。
16. 其他难以预料及难以解释的意外。

患者知情选择:

1. 我的医生已经告知我将要进行的手术方式、此次手术及术后可能发生的并发症和风险、可能存在的其它治疗方法并且解答了我关于此次手术的相关问题。
2. 我同意在手术中医生可以根据我的病情对预定的手术方式做出调整, 风险一旦发生, 本人授权医护人员按照医学常规予以处置。
3. 我理解我的手术需要多位医生共同进行。
4. 我并未得到手术百分之百成功的承诺。
5. 我授权医师对手术组织标本进行处置, 包括病理学检查、细胞学检查和医疗废物处理等。

患者或代理人签字:

与患者关系:

日期:

日

医生陈述:

我已经告知患者将要进行的手术方式、此次手术及术后可能发生的并发症和风险、可能存在的其它治疗方法并解答了患者关于此次手术的相关问题。

谈话医师:

日期:

日



手术知情同意书

上海市第十人民医院
同济大学附属第十人民医院
SHANGHAI TENTH PEOPLE'S HOSPITAL
TENTH PEOPLE'S HOSPITAL OF TONGJI UNIVERSITY



姓名: 性别: 年龄: 科室: 床号: 住院号:

术前诊断: 西医诊断: 子宫平滑肌瘤

手术适应症:

患者子宫肌瘤诊断明确, 肌瘤体积较大, 患者已有月经期延长、肌瘤脱出等症状, 与患者充分沟通及院内会诊后拟今日行超声引导下子宫肌瘤微波消融术。

拟行麻醉方法: 静脉麻醉+神经阻滞

拟定手术名称:

1、超声引导下子宫肌瘤微波消融术

手术中和手术后可能发生的并发症:

- 1、患者严重脊柱侧弯畸形, 全身麻醉风险大, 根据手术情况选择神经阻滞+静脉麻醉, 但仍有引起血流动力学、心律失常、呼吸抑制等可能, 特殊情况下可能需要气管插管、气管切开等;
- 2、患者肌瘤带蒂且血供丰富, 虽已行CT引导下栓塞, 穿刺部位仍可能出现大出血、血肿、皮下淤血、皮肤坏死可能, 如出血量大, 可能需要紧急宫腔内填塞或转开放手术止血等情况;
- 3、术后感染可能, 如穿刺点感染、宫腔内感染、盆腔感染, 重者可出现败血症、脓毒血症, 危及生命;
- 4、子宫消融手术为有创手术, 存在周围脏器穿刺损伤与热损伤风险: 如肠穿孔、膀胱穿孔、网膜损伤、应激性门肠道穿孔、腹膜炎等并发症; 一旦出现, 应积极配合医生做相应处理;
- 5、子宫消融术中为达到消融完全, 消融范围会超出术前超声显示病灶范围; 因而术后短期内复查超声消融灶大小可能较前增大; 消融手术可存在病灶残留或复发, 术后复查可见新生病灶;
- 6、消融治疗后病灶回声性质、特点较前改变, 术后病灶吸收、缩小是一个长期缓慢的过程, 缩小速度存在个体差异, 需规律复查;
- 7、若穿刺病理结果显示为恶性病变, 术后需及时复诊评估病情并制定进一步专科治疗方案;
- 8、子宫肌瘤可继发月经量大、淋漓不尽、贫血、宫腔或盆腔感染等, 术后存在病情反复者, 可能需要多次消融;
- 9、患者子宫肌瘤已脱出至引导, 术后可能出现阴道积液、流血及有坏死物质脱落的可能
- 9、由于个体差异, 按现有医学认知不能解释并需要说明的其他特殊情况。
- 10、其他难以预料的意外事件。

替代医疗方案(明列替代手术的名称或保守治疗的主要措施):

保守治疗、手术切除

对上述手术风险及并发症, 如患者或代理人不理解可以向医师咨询, 在患者或代理人充分理解以后, 自主决定是否选择手术治疗或按替代医疗方案实施。请在本文书上写明意见并签名。

患方选择意见(请写明同意手术的具体名称):

患者(代理人)签名

年 月 日

经治医师签名:

手术医师签名:

年 月 日

第1页



扫描全能王 创建