

동국대 일산병원 피부과 조직검사 동의서

1. 조직검사는 피부 병변을 2mm~4mm 떼어 내어 조직학적으로 진단하는 방법입니다.

2. 검사방법



- 떼어낼 피부를 주사로 국소 마취 합니다.
- 펀치 기구를 이용하여 직경 2-4mm 정도 크기로 떼어냅니다.
- 떼어낸 부위는 1-2바늘 꿰맹니다.
- 검사 결과는 약 1-2주일 후에 나오며 실밥은 보통 검사 결과 듣는 날에 제거하게 됩니다.

3. 부작용 및 주의사항

- 조직 생검 부위에 세균 감염이 되면 빨갛게 되고 붓고 아플 수 있습니다. 이러한 염증이 생기면 상처 치유가 늦어지고 흉터가 남을 수 있습니다.
- 감염 예방을 위해 조직검사 부위에는 물이 닿지 않게 해 주시고, 하루에 한번 항생제 연고(베어로반 또는 후시딘) 도포 후 방수밴드를 붙여주시기 바랍니다.
- 조직검사 부위는 선상의 흉터가 발생할 수 있습니다.
- 경우에 따라 켈로이드나 비후성 변흔이 생기기도 하는데 이 경우 조직검사 부위가 단단하고 커지며 가려울 수 있습니다. 켈로이드가 생기는 경우 주사 치료 등의 별도의 치료가 필요합니다.

4. 과거력 및 가족력 (해당되는 항목에 체크 표시 해주시기 바랍니다.)

- ☐ 저/고혈압 ☐ 심장병 ☐ 당뇨병 ☐ 출혈소인 ☐ 약물 알러지 ☐ 기타 ()
☐ 켈로이드 과거력/가족력 ☐ 백반증 과거력/가족력

5. 조직 검사 시 촬영한 사진의 학술적 사용 동의 (선택사항)

조직 생검 전 해당 부위의 사진 촬영을 시행하게 됩니다. 학술연구가 필요한 경우, 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 임상 사진을 사용하는 것에 대한 동의 여부를 아래 확인란에 체크해주시고.

촬영한 임상 사진의 학술적 사용 동의 여부 : ☒ 동의 ☐ 동의하지 않음

본인은 조직검사 방법과 주의사항에 대해 충분히 이해하였습니다.

환자와의 관계: _____

서명(싸인): _____

날짜: _____



2022-08-12 SPP (0009)
김기봉 520809 70/M
11038807 DM