

门诊号

姓名

科室: 急诊科

深圳市第二人民医院

病程记录

性别: 男

年龄: 39

2021年06月24日13时13分

患者于11:40肌注新斯的明1.0mg,每10分钟评估患者症状,观察至12:40患者言语困难、吞咽困难等症状无明显改善,与家属沟通病情,告知家属根据专科意见予免疫球蛋白冲击治疗,告知相关费用问题,家属理解病情及费用问题并同意用药。

治疗:

免疫球蛋白注射液(2.5克*1瓶/瓶) 11瓶/27.5克 ST 静滴

5%葡萄糖注射液(直立)(500毫升*1袋/袋) 1袋/500毫升 ST 连续静滴

医师签名:陈吕峰 盖章:

深圳市第二人民医院

激素治疗知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 男 年龄: [REDACTED]
科别: [REDACTED] 床号: 24 住院: [REDACTED]

本人因 发作性言语不能伴吞咽困难2天。 入院, 医生已向我解 需使用糖皮

质激素治疗, 医生已向我解释激素治疗可能产生如下不良反应:

- 一、体液与电解质紊乱: 钠潴留、体液潴留、充血性心力衰竭、钾离子丧失、低钾性碱中毒、高血压。
- 二、肌肉骨骼系统: 肌无力、类固醇性肌病、骨质疏松、压迫性脊椎骨折、无菌性坏死、病理性骨折。
- 三、胃肠道: 可能穿孔或出血的消化性溃疡、消化道出血、胰腺炎、食道炎、肠穿孔。
- 四、皮肤: 妨碍伤口愈合、皮肤薄脆、瘀点或瘀斑、反复局部皮下注射可能引起局部皮肤萎缩。
- 五、神经系统: 颅内压升高、假性脑肿瘤、癫痫发作。服用皮质类固醇可能出现下列精神紊乱的症状: 欣快感、失眠、情绪变化、个性改变及重度抑郁直至明显的精神病表现。
- 六、内分泌: 月经失调、出现柯兴氏体态、抑制儿童生长、抑制垂体肾上腺皮质轴、糖耐量降低、引发潜在的糖尿病、增加糖尿病患者对胰岛素和口服降糖药的需求。
- 七、眼: 长期使用糖皮质激素可能引起后囊下白内障、青光眼、并增加眼部继发真菌或病毒感染的机会。眼内压增高、眼球突出。
- 八、代谢: 因蛋白质分解造成的负氮平衡。
- 九、免疫系统: 掩盖感染、潜在感染发作、机会性感染、过敏反应、可能抑制皮试反应。
- 十、以下不良反应与胃肠道外给予皮质类固醇有关: 过敏反应、心脏停搏、支气管痉挛、低血压或高血压、心律不齐。

医生将尽量预防这些不良反应, 但仍不能完全排除激素治疗可能发生的并发症。同意使用激素治疗需承担激素应用过程中可能发生风险。但如拒绝激素治疗, 则可能耽误疾病的治疗。

患者及家属意见:

我已充分理解。

(同意/不同意) 激素治疗。

患者及家属签字:

患者与签字人关系:

医疗主管医师签字:

2021年06月26日

2021年06月26日