

南昌大学第一附属医院
抗癌药物治疗知情同意书

姓名: 性别: 男性 年龄: 49岁 科别: 床号: 住院号:

诊断: 1. 腹膜间皮瘤, IVA (主诊断)

2. 脾继发恶性肿瘤

3. 乙型肝炎小三阳

诊断依据: 病理及影像学

替代治疗方案 ☒ 有 ☐ 无

患者经院方医师诊断为恶性肿瘤, 需要选择抗癌药物治疗 (包括化疗与生物治疗等)。抗癌药物治疗方案依据来源于指南、专家共识、相关临床研究。可选择的方案有:

☐ 顺铂+氟尿嘧啶、☐ 吉西他滨+顺铂/卡铂/奈达铂、

☐ 阿霉素/表阿霉素+多西他赛+环磷酰胺、☐ 依托泊苷+顺铂/卡铂/奈达铂、

☐ 奥沙利铂+氟尿嘧啶 ☐ 其它:

经治医生为患者制定的方案为: 培美曲赛 800mg d1+顺铂 60mg d1-2+赛帕利单抗240mg。

由于抗癌药物治疗效果受患者个体差异和肿瘤异质性等多种因素的影响, 故疗效不尽相同, 有时无效, 甚至病情发展或恶化。常规使用的细胞毒性药物除杀伤肿瘤细胞外, 对人体某些正常组织, 细胞也可能造成一定程度的损害, 偶尔十分严重。常见毒副反应如下:

1、消化系统反应: 包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛、肠麻痹、肝功能损害等。严重时可能发生水电解质紊乱和消化道出血。2、血液学毒性, 主要有白细胞、血小板下降, 严重者可能合并全身感染、出血, 甚至死亡。3、药物过敏反应: 如发热、皮疹、过敏性休克等。4、心血管系统毒性: 如心肌和传导系统损害、心搏骤停、心律失常及动静脉炎等。5、皮肤粘膜、毛发毒性: 如局部皮肤红肿溃烂、发炎、色素沉着、脱发等。6、呼吸系统毒性: 呼吸困难, 肺纤维化等。7、泌尿生殖系统毒性: 如化学性膀胱炎、尿道炎、血尿和肾功能障碍等。8、神经系统毒性: 包括周围神经炎 (手足麻木) 和精神症状等。9、其它: 包括某些远期毒性等等。

对上述情况经治医师将尽力防治, 但有时仍难以预料和完全避免。依据有关法律, 作为患者拥有知情权和接受相关治疗的决定权利。在经治医师已进行全面说明和详细交代的基础上。如果病人或家属 (或单位领导) 对此能充分理解, 自愿在本院接受和配合抗癌治疗, 请在知情同意书上签署接受治疗与否的意见并签署姓名。本文具有法律效力。

病人或家属

(或单位领导) 意见: _____

病人或家属

(或单位领导) 签名: _____

经治医师签名: _____

日期: 2022年07月20日 11:08:31

日期: 2022年07月20日 11:08:31

