

# 安徽省口腔医院牙体牙髓科治疗须知

患者姓名 [ ] 性别 女 年龄 9 联系方式 [ ] [牙位 [ ] ID 号 [ ]

尊敬的患者（家属）：

牙体牙髓科是从事牙体病（牙体缺损、折裂、变色、畸形）和牙髓病（牙齿疼痛、肿胀）诊疗工作的专业科室。我们的临床医师会根据您的实际病患情况为您制定最适合您的治疗方案，同时我们也需要您的积极配合以达到理想的治疗效果。请在接受治疗前仔细阅读以下内容：

## 一、充填治疗

- 1、适用于修复较小范围内的龋坏、外伤、磨损等原因造成的牙齿缺损。
- 2、范围较大的牙齿缺损可能已累及牙髓，治疗前须拍摄X光片明确诊断。
- 3、曾经治疗过或在其他医院治疗到一半的牙齿，重新治疗前必须拍摄X光片了解以往治疗情况。
- 4、因牙齿缺损的程度、部位以及充填材料的种类不同，不同患牙会发生不同的治疗费用。
- 5、牙体缺损充填治疗后数日至数周内，患牙有轻微冷热敏感症状多数属正常反应，一般可自行缓解。
- 6、为尽量保存活髓，对于不能诊断为牙髓炎的深龋，医生按常规进行充填治疗。如果充填后出现敏感症状长期无好转或有疼痛加重、自发痛、咬合痛，则可能有牙髓炎症，需及时复诊，采用其他方法继续治疗。
- 7、缺损较大的牙齿、固位较差的牙齿（如门牙缺角），充填后可能出现充填材料折断、脱落。发生此种情况医生将换用其他材料或改用其他方法进一步治疗，则可能增加新的治疗费用。

## 二、根管治疗

- 1、当牙髓（牙神经）发生病变、坏死时，必须做根管治疗才能保存患牙。牙齿病损范围已经到达牙根和牙龈下方深处的则须考虑拔除患牙。
- 2、治疗过程中为缓解疼痛，可能需要配合局部麻醉，请避免空腹并如实告知您的全身情况及过敏史。注射局部麻醉药后短时间内可能出现心跳加快等不适症状，一般平卧后可自行缓解。局部麻醉有可能出现局部血肿和张口受限，可自行缓解，冷敷或理疗可以促进症状减轻。
- 3、根管治疗包括根管预备、消毒、充填等较多步骤，需要多次复诊并拍摄数张X光片才能完成。在治疗期间可能出现疼痛不适，多属术后正常反应，请您遵医嘱按预约时间复诊。如果疼痛严重，伴有局部肿胀和全身反应（如发热），应及时就诊，非正常门诊时间可到口腔综合科急诊处理。为保证根管治疗的效果，根管治疗一般由首诊医师完成整个治疗过程。
- 4、根管治疗时如遇到复杂根管：弯曲、狭窄、钙化阻塞、器械折断、侧穿、曾经不良根管治疗或其他特殊情况时，治疗难度和风险增大，需要使用特殊器械和材料，治疗的时间和费用也会相应增加。对于无法扩通的复杂根管，不应强求留在根管中，不会对机体有害。
- 5、牙髓病变坏死的牙齿抗折能力会降低（尤其是隐裂牙），容易牙齿劈裂导致拔牙。因此在根管治疗期间以及治疗后均请避免使用患牙咀嚼硬物，并遵医嘱及时行冠修复。
- 6、牙髓治疗后，机体有一个修复适应过程，短期内会有部分患者感觉不适，可采取观察的方法，或遵照医嘱及时复查。少数病例会治疗失败，尤其是隐裂牙和曾经根管治疗的牙齿。确为常规治疗无法治愈的患牙，必要时须中止治疗并拔除患牙。

患者（家属）意见：

我已充分了解上述治疗内容、风险及费用，同意接受治疗并支付费用。

患者签名 [ ]

签名日期： [ ]

如果患者无法签署知情同意书，请其授权的代理人在此签名：

患者家属（或患者委托代理人）签名： [ ]

经主治医师： [ ]

与患者的关系： 妈妈

签字日期 [ ]