

根管治疗知情同意书

患者姓名 性别 女 年龄 45 联系方式

尊敬的患者，根管治疗是目前国际上普遍采用的疗效恒定的一种保存患牙的治疗方法。应用于牙髓发炎或已坏死的牙齿。需要经过局部麻醉，开髓，根管预备，封药，充填和拍摄多张X线片（小牙片）才能完成整个治疗过程。

患牙牙位 61 诊断为 慢性根尖周炎 预计费用 1500 元（不包含全冠修复及X线牙片，其中约 50% 属于自费项目）

根管治疗须知：

1. 根管治疗后的牙齿抗折断能力降低，易劈裂，治疗后请避免使用患牙咀嚼硬物，或遵医嘱及时行全冠或桩核冠修复。
2. 治疗过程中为了缓解疼痛，需要配合局部麻醉。请如实告知您的全身情况，以便医生为您选择适当的麻醉方法。注射局麻药后段时间也许会有心跳加快，头晕等不适症状，一般平卧后可自行缓解。
3. 一般治疗过的牙齿出现问题，首先要拍X光片了解以前的治疗方法及效果。做根充治疗后需拍片检查根充效果后才能永久充填。对疑似根尖周病变的患牙也需拍摄X线牙片辅助诊断。另外，一些临幊上观察不到的位置也需要拍片帮助诊断。
4. 治疗过程中，由于张口时间比较长，有可能发生颞下颌关节不舒服或僵硬以及由于器械较长时间牵拉口角唇颊等部位而引起口腔粘膜及软组织损伤等。
5. 在根管治疗过程中要清洗消毒根管，以利于用材料将根管充填起来，由于牙埋伏在领骨中，术前医生只能依据牙体解剖形态及X线片或根尖定位仪对根管系统进行大致了解，遇复杂根管，如弯曲、细窄、钙化阻塞或其余特别情况，偶然也许发生器械折断在根管内的情况，对于取不出的器械，不可强行取出，可作为根充材料的一部分保留在根管中，不会对机体产生损害。
6. 根管治疗过程中，根据患牙情况复诊次数不定，一般需换药2-3次，复诊时间不定，一般3天或7天。所封药物有一定的刺激性，有可能引起疼痛甚至肿胀，通常几天后会好转，可配合口服消炎药、止痛药。若无效应及时复诊。
7. 根管预备或根管充填后一周内也许会出现疼痛反应，多数属于正常现象，如疼痛严重，伴有局部肿胀和全身反应，应及时复诊，酌情进一步治疗。
8. 由于患者的个体差异，治疗的成功率也有差异，目前根管治疗的成功率约为60%-80%，如常规的根管治疗失败，可以试行根尖手术的方法治疗或者拔除患牙。
9. 曾经做过治疗(杀神经或根管治疗)的牙齿再次治疗成功率会显著下降，若治疗失败则只能拔除患牙。
10. 治疗过程中，如患者未与医生沟通，擅自取出根管内药物或充填材料，或私自去别院就诊，所出现问题由患者负全责。
- 11.

上述内容患者已理解，患者愿意承担治疗可能出现的风险并遵从医嘱，配合医生完成根管治疗并同意支付所需全部费用。

患者签名：

签字日期：2018年1月30日

如果患者无法签署知情同意书，请其授权的代理人在此签名：

患者家属（或患者委托代理人）签名：_____ 与患者的关系：_____

医师签名： / 闻雯

天津医科大学口腔医院牙体牙髓科

签字日期：2018年1月30日

根管治疗知情同意书

患者姓名 性别 女 年龄 63 联系方式 36

尊敬的患者，根管治疗是目前国际上普遍采用的疗效恒定的一种保存患牙的治疗方法。应用于牙髓发炎或已坏死的牙齿。需要经过局部麻醉，开髓，根管预备，封药，充填和拍摄多张X线片（小牙片）才能完成整个治疗过程。

患牙牙位 16 诊断为 慢性根尖周炎 预计费用 1500 元（不包含全冠修复及X线牙片，其中约 50% 属于自费项目）

根管治疗须知：

1. 根管治疗后的牙齿抗折断能力降低，易劈裂，治疗后请避免使用患牙咀嚼硬物，或遵医嘱及时行全冠或桩核冠修复。
2. 治疗过程中为了缓解疼痛，需要配合局部麻醉。请如实告知您的全身情况，以便医生为您选择适当的麻醉方法。注射局麻药后段时间也许会有心跳加快，头晕等不适症状，一般平卧后可自行缓解。
3. 一般治疗过的牙齿出现问题，首先要拍X光片了解以前的治疗方法及效果。做根充治疗后需拍片检查根充效果后才能永久充填。对疑似根尖周病变的患牙也需拍摄X线牙片辅助诊断。另外，一些临幊上观察不到的位置也需要拍片帮助诊断。
4. 治疗过程中，由于张口时间比较长，有可能发生颞下颌关节不舒服或僵硬以及由于器械较长时间牵拉口角唇颊等部位而引起口腔粘膜及软组织损伤等。
5. 在根管治疗过程中要清洗消毒根管，以利于用材料将根管充填起来，由于牙埋伏在颌骨中，术前医生只能依据牙体解剖形态及X线片或根尖定位仪对根管系统进行大致了解，遇复杂根管，如弯曲、细窄、钙化阻塞或其余特别情况，偶然也许发生器械折断在根管内的情况，对于取不出的器械，不可强行取出，可作为根充材料的一部分保留在根管中，不会对机体产生损害。
6. 根管治疗过程中，根据患牙情况复诊次数不定，一般需换药2-3次，复诊时间不定，一般3天或7天。所封药物有一定的刺激性，有可能引起疼痛甚至肿胀，通常几天后会好转，可配合口服消炎药、止痛药。若无效应及时复诊。
7. 根管预备或根管充填后一周内也许会出现疼痛反应，多数属于正常现象，如疼痛严重，伴有局部肿胀和全身反应，应及时复诊，酌情进一步治疗。
8. 由于患者的个体差异，治疗的成功率也有差异，目前根管治疗的成功率约为60%-80%，如常规的根管治疗失败，可以试行根尖手术的方法治疗或者拔除患牙。
9. 曾经做过治疗(杀神经或根管治疗)的牙齿再次治疗成功率会显著下降，若治疗失败则只能拔除患牙。
10. 治疗过程中，如患者未与医生沟通，擅自取出根管内药物或充填材料，或私自去别院就诊，所出现问题由患者负全责。

11.

上述内容患者已理解，患者愿意承担治疗可能出现的风险并遵从医嘱，配合医生完成根管治疗并同意支付所需全部费用。

患者签名：

签字日期：2018年5月4日

如果患者无法签署知情同意书，请其授权的代理人在此签名：

患者家属（或患者委托代理人）签名： 与患者的关系：

医师签名： KHJ/2113 天津医科大学口腔医院牙体牙髓科

签字日期：2018年5月4日