

北京大学第三医院口腔科牙体根管治疗同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 男 出生日期: 79 年 8 月 14 日

病历号: [REDACTED] 电话: [REDACTED] 地址: [REDACTED]

初步诊断: 左上第一磨牙不可逆性牙髓炎

根管治疗是目前国际上普遍采用的治疗牙髓疾病（牙髓炎和根尖周炎）的方法，其治疗过程较为复杂，疗程较长，费用较高。

1. 牙髓疾病治疗过程中为了缓解疼痛，有时需要配合局部麻醉。请如实告知您的全身情况，以便医生为您选择适当的麻醉方法。注射局部麻醉药后短时间内可能会有心跳加快等不适症状，一般平卧后可自行缓解。局部麻醉有可能出现局部血肿和张口受限，可自行缓解，冷敷或理疗可以促进症状减轻。

2. 牙髓疾病治疗有时需要牙髓失活，也可以局麻下直接拔髓处理。封药后请遵医嘱按时复诊。在此期间出现疼痛等不适症状多属于封药后反应。若疼痛较为剧烈请及时就诊。

3. 根管治疗是一种较为复杂的牙髓治疗方法，需要进行牙髓失活、根管预备、根管充填和拍摄多张 X 光片才能完成整个过程。在治疗期间和治疗后一段时间，可能会出现疼痛等不适症状，多数属于正常反应，可按预约时间复诊。如果疼痛严重、伴有局部肿胀和全身反应，应及时就诊，酌情进一步治疗。

4. 根管治疗时医生只能根据 X-光片或根尖定位仪对根管系统进行大致了解，如遇复杂根管（弯曲、狭窄、钙化阻塞、器械折断、侧穿）或其他特殊情况时，根管治疗难度增大，需要使用特殊设备和材料，治疗时间和费用要相应增加。对复杂根管治疗中可能发生的器械折断情况，不可要求强行取出折断器械，该器械可以作为根管充填材料的

一部分留在根管中，不会对机体有害。

5. 根管治疗中和治疗后，牙齿抗折能力降低，容易劈裂，而导致拔牙。治疗后应避免使用患牙咀嚼硬物，或遵医嘱及时行全冠修复或桩冠修复。

6. 牙髓治疗后，机体有一个修复过程，在相当一段时间内有些患者会感到被治疗的牙齿不舒服。如果情况不是逐渐加重，可采取观察的方法，但应遵守医嘱及时复查。牙髓治疗有少数病例治疗不成功。确为常规牙髓治疗无法治疗或治疗失败的病例，可采用根尖手术等方法继续治疗。

我已如实向医生报告了我的现病史和全身健康情况以及相关的个人信息。医生对我进行了检查，向我介绍了病情；医生向我介绍了治疗计划、治疗方法、治疗程序及可能存在的风险和并发症。医生向我介绍了估算治疗费用以及特殊情况下可能引发的其他费用；我已详细阅读上述内容并完全知晓。我理解医生的上述解释，愿意接受医生提出的治疗方案和方法，并承担治疗风险，保证按照要求配合治疗，同意按规定支付费用。我同意将我的病历资料及照片用于非商业意图的临床及教学研究和学术交流。

患者签字：

患者监护人或亲属签字：

日期：2015年12月2日

医生签字：

日期：2015年12月2日

