

口腔正畸治疗知情同意书

一、矫正疗程 牙颌畸形是儿童的发育畸形,矫正牙齿是要使长在齿槽嵴内的牙齿移动到正常位置,这是一个生物改建过程,因此疗程较长。一般乳牙期和替牙期牙颌畸形的治疗需要1年左右,恒牙期治疗需要2年左右,疑难患者及特殊病例需更长时间。治疗完成后还需戴用保持器2年左右,少数患者需要更长时间,甚至终生保持,以防复发。

二、矫正费用 正畸治疗是健康和美丽的一项投资,不同于购买一件商品,其费用因畸形程度、矫正器种类、患者合作程度、年龄、疗程等而各不相同,请您在决定治疗前咨询您的主治大夫目前大致的收费情况。由于正畸治疗带有一定的美容性质,国家规定属于自费医疗项目。

三、接受正畸治疗必须注意的问题 1. 初戴矫治器及每次复诊加力后,牙齿可能出现轻度反应性疼痛或不适,一般持续3—5天后即可减轻及消失。若疼痛3—5天不减轻反而加重,或出现其它情况,则需及时与医生联系就诊检查。

2. 戴用固定矫正器的患者要特别注意口腔卫生。早、晚及进食后,复诊前都必须刷牙,要把牙齿上的软垢及留存的食物残渣仔细刷干净,否则易造成牙龈炎、牙周炎、牙齿脱钙及龋齿,影响矫正进行及口腔健康。对于不能很好保持口腔卫生的患者,为不影响口腔健康,我们将终止治疗。

3. 在固定矫正器的治疗过程中,不能吃硬、粘食物,大块食物弄小后再吃,以防矫正器损坏。若发现带环松脱、弓丝折断等情况而影响口腔功能时,应及时与医生联系,确定是否需来院处理。

4. 矫正过程中必须按照医嘱定期复诊。一般戴上固定矫治器后每三、四周左右复诊一次。若不按时复诊或长期不就诊,矫治牙将失去治疗控制,会出现牙齿移位异常,或治疗无进展等情况。对于超过半年无故不来就诊的患者,将视作自动终止治疗,若再要治疗需按新患者程序重新登记开始。

5. 需用颌内牵引、颌间牵引、颌外牵引(头帽、口外弓、前方牵引等)的患者,每天必须戴足医师指定的时间,否则将影响治疗效果,使矫治疗程延长。在取下颌外牵引装置时(头帽、口外弓、前方牵引器等),应先取下弹力圈,再卸下颌外牵引装置,以免造成牙齿及面部组织器官的意外损伤。

6. 尽管患者与医生都不愿意拔牙,但仍有65%左右的牙颌畸形必须通过拔牙才能矫正。

7. 患者18岁之前均处于生长发育期,若颌骨生长型异常,治疗结果则难以令人满意,异常生长在保持期还可表现为畸形复发,严重的发育异常可能需要结合外科手术去进一步治疗。部分正畸治疗需要利用患者的正常生长潜力,如果患者不能遵照医嘱积极配合,则会丧失治疗时机。

8. 现代医学研究发现,正畸患者的颞下颌关节病(TMD)发病率与普通人群的TMD发病率相同,因此常规正畸治疗既不会引起也不能阻止TMD的发生。如果患者治疗前就有颞下颌关节弹响、疼痛等症状,请向你的主治大夫咨询治疗中可能出现的问题。

9. 正畸治疗过程中可能会出现非医生所能控制的不同程度的牙根吸收。

10. 医师的设计方案综合考虑了患者要求、健康、美观、功能、稳定等因素,可能不能完全满足您的所有要求或特殊喜好,但我们会尽最大的努力为您提供目前医疗水平所能达到的最好治疗结果。

四、矫正资料 患者的病历、牙骀模型、照片、X光片是医院对患者进行诊断、设计、控制治疗进程、观察复发趋势等的重要参考资料,均由医院保存使用,患者个人不得随意带走。

对于上述各条内容,我已详细阅读并理解,同意接受正畸治疗。 吉林大学口腔医院口腔正畸科

对于以上各条内容,我已详细阅读并理解,同意接受正畸治疗。

患者姓名:

病历号: 2017-113

签名:

与患者关系 本人

医师签名:

(未成年患者由家长签名)

2017 年 11 月 23 日