

手术同意书

患者姓名	性别: 男	年龄: 1岁1月	预定手术日期: 2016-09-05
术前诊断: 右侧类孟氏骨折 (尺骨干骨折, 桡骨颈骨折伴肱桡关节脱位)			
手术指征: 尺桡骨骨折伴肱桡关节脱位			
拟定手术名称: 右尺桡骨骨折切开复位骨针固定术, 肱桡关节切开复位术			
麻醉方法: 全麻			
术前准备: 通知手术室麻醉科			

小儿骨科一手术同意书

术中或术后可能出现的并发症和手术风险

1. 经过术前检查, 目前诊断如上。此次手术计划先试行骨折闭合复位骨针固定术。如果骨折闭合复位失败, 则骨折切开复位骨针内固定术。无论切开还是闭合复位骨折, 都有可能达不到完全复位复位, 只要达到允许范围就不会影响功能。同时行肱桡关节脱位的闭合复位术。如果闭合复位失败, 则行肱桡关节切开复位术, 用骨氏针内固定。
2. 术中术后发生心, 肺, 脑, 肝, 肾等器官症意外 (几率较低);
3. 术后切口感染, 不愈合; 继发形成慢性骨髓炎, 需长期应用抗生素、换药或手术;
4. 术后骨针可能松脱、针眼及针道感染。骨针断裂。
5. 有可能出现骨不连、骨折延迟愈合, 骨化性肌炎形成。如不恢复需二次手术。
6. 术后极度肿胀, 发生骨筋膜室综合症, 可导致上肢残疾, 需早期切开减压;
7. 术后康复训练并防止外伤及骨折移位; 术后切口形成瘢痕;
8. 桡骨颈骨折为关节内骨折, 术后可能出现关节僵硬、发生创伤性关节炎, 影响关节活动; 主要影响肘关节的旋转功能和屈伸功能。术后通过功能锻炼, 可能会有所改善。如果改善不明显, 需要再次手术解除肘关节的粘连。
9. 因为是桡骨近端骨骺分离骨折, 手术复位后仍然有桡骨近端生长障碍的可能。
10. 术后需石膏固定1.5月或以上, 有发生石膏压疮可能。
11. 本病人特殊情况:
12. 术中因为切口美容, 术后预防感染, 减少瘢痕等原因, 术中可能需要可吸收线和组织胶水。这些材料可能需要自费, 医疗保险不予报销, 高分子石膏和骨针是可能是自费, 保险公司不予报销。
13. 如果同意上述治疗方案并且承担风险, 则在下方录取指纹。

经医生充分告知, 我已经详细了解上述交待内容,
经本人考虑, 愿意承担上述风险及并发症, 要求手术。

经医生充分告知, 我已经详细了解上述交待内容, 经本人考虑, 愿意承担上述风险及并发症, 要求手术。

通知日期: 2016年09月02日 09时04分

与患者关系父母

身份证:

指纹签字:

医院意见 (必要时审批)

医生签字:

李郁伟

2016-12-14 15:04:58