

# 川北医学院附属医院口腔科

## 牙周病知情同意书

牙周病是我国成年人丧失牙齿的首要原因，在其慢性发展过程中，疼痛不明显，会逐渐出现牙龈出血、红肿、出脓、萎缩，牙缝增大、咀嚼无力、牙齿松动，直至牙齿脱落，需积极进行治疗。

1. 牙周治疗需要有计划地进行序列治疗。主要包括：基础治疗、相关学科的治疗、牙周手术治疗、牙周维护期治疗。需按医生要求及时复诊、定期复查，在治疗过程中需辅以 X 线片检查。
2. 国内外都没有治疗牙周病的特效药，药物无法控制牙周病，长期服药还会对身体其他器官造成损害。
3. 牙周病可以分为轻、中、重度，具体的治疗项目及相应的收费标准，见牙周治疗价目表。
4. 牙周病的治疗必须全口同时进行。因为牙齿周围的组织是整体相连的，细菌不单独存在于某个牙上，单独治疗会出现口腔其它牙的细菌再次繁殖于治疗牙上，从而导致治疗的失败。
5. 重度牙周炎患者必须进行牙周手术治疗，单靠基础治疗仅能改善牙龈表面症状，如牙龈红肿出血等，但不能彻底根除牙周骨组织周围的细菌，以致疾病发展转为隐蔽性高的状态，最终致牙松动。牙周手术能彻底清除所有细菌，获得最稳定良好的疗效，从而延长患牙在口腔中的寿命。
6. 牙周病的治疗需要多学科的联合治疗，牙周病是一个多因素疾病，治疗效果受局部解剖因素、咬合创伤因素、吸烟、遗传、全身因素等的影响。对于某些复杂的病例还需要配合进行牙髓、修复、正畸治疗才能达到较好的疗效。
7. 牙周病具有慢性疾病的特点：发展不可逆，治疗需及时彻底。牙龈萎缩、牙缝增大、食物嵌塞、牙根暴露引起的敏感、明显松动的牙齿等，彻底及时的治疗可以控制病情，减少牙脱落，但无法恢复，建议您及早进行牙周治疗。
8. 牙周病需要长期治疗，牙周病的治疗不是一劳永逸的，治疗效果的好坏在于医患双方的共同努力。患者需配合医生采用有效的方法，保持口腔卫生、控制菌斑，并定期进行预防性洁治及相关的维护治疗。重度牙周炎患者需 3~6 个月进行一次维护治疗，轻、中度牙周炎需 1~3 个月进行一次维护治疗。
9. 未加以控制的牙周病会加重全身疾病，国内外大量研究表明：牙周病是急性心肌梗死、脑卒中、冠心病等心血管疾病的危险因素；牙周病与糖尿病有双向关系，会影响血糖控制；牙周病对孕妇的危害远大于吸烟饮酒，会导致早产和低体重儿；牙周病与呼吸系统感染、胃病、类风湿性关节炎等密切相关。因此，为了您全身健康，请您及早彻底控制牙周病。

患者姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

科室：\_\_\_\_\_ 门诊号：\_\_\_\_\_

医生姓名：\_\_\_\_\_ 职称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_