

北京大学深圳医院 (医学影像科)

碘对比剂使用患者知情同意书

- 1、既往有无使用碘剂不良反应的病史。 有 ☐ 无 ☒
- 2、既往有无使用其它药物不良反应的病史。 有 ☐ 无 ☒
- 3、有无甲状腺功能亢进、严重肾功能不全、哮喘病史。 有 ☐ 无 ☒
- 4、使用碘对比剂，可能出现不同程度的不良反应。

轻度不良反应：咳嗽、喷嚏、一次性胸闷、结膜炎、鼻炎、恶心、全身发热、荨麻疹、瘙痒、血管神经性水肿等。

重度不良反应：喉头水肿、反射性心动过速、惊厥、震颤、抽搐、意识丧失、休克等，甚至死亡或其他不可预测的不良反应。

迟发性不良反应：注射碘对比剂1小时至一周内也可能出现各种迟发性不良反应，如恶心、呕吐、头痛、骨骼肌肉疼痛、发热等。

- 5、碘对比剂漏出，造成皮下组织肿胀、疼痛、麻木感、甚至溃烂、坏死等。
- 6、用高压注射器时，存在注射针头脱落、局部血管破裂的潜在危险。
- 7、如果出现上述不良反应的症状，请及时与相关医师联系，

联系电话：83923333-5127, 5130.

- 8、我已详细阅读以上告知内容，对医护人员的解释清楚和了解，经慎重考虑，同意做此项检查。

- 9、其他条款：

签署人

患者本人签名：

患者监护人签名：

监护人与患者的关系：

父女

谈话医生：

签署日期：

张多

2020.6.9