

小肠胶囊式内镜检查患者知情同意书

姓名: [REDACTED] 性别: 女 年龄: 73 ID: [REDACTED]

拟诊:

患者经医师拟诊为: [REDACTED], 因病情需要, 选择进行一次小肠胶囊式内镜的辅助检查从而协助诊断。

本检查过程为: 吞咽微型的 PillCam™ 无线小肠胶囊式内镜。一般情况下, 这种胶囊将自然穿过患者的消化道, 并在消化道中摄取图像。这些图像将传送到分布在患者胸腹部的传感器中。传感器与类似随身听的数据记录仪连接, 数据记录仪则挂戴在患者的腰部并保存数据信号。检查结束后(约 6-8 小时), 将取下数据记录仪由医师进行计算机数据处理。

PillCam™ 小肠胶囊为一次性使用, 它会随着肠道的蠕动自然排出体外, 其适应症主要为小肠疾病。本检查有一定的风险性, 它的禁忌症包括: 1. 胃肠道梗阻、狭窄或瘘管形成; 2. 患者体内有心脏起搏器或植入有其它电子医学仪器; 3. 孕产妇; 4. 吞咽困难; 5. 患者身体条件无法承受或不愿进行手术治疗者; 6. 其它可能造成不良后果的病症。检查过程中极少数病例可能出现以下并发症和风险, 但不仅限于:

1. 对胶囊外壳材料(医用生物相容性高分子材料)过敏。
2. 肠道准备所使用之相关药物的副作用风险。
3. 自身消化道疾病或其它原因无法自然排出而在体内滞留, 并可能需要借助普通内镜技术或外科手术取出胶囊, 费用自理。
4. 少数患者可能因为食管胃肠动力障碍或狭窄等原因造成胶囊不能在预定时间内顺利通过贲门或幽门, 或胃肠道内容物过多而影响对胃或小肠的检查效果。
5. 必要时需要借助胃镜将胶囊送入小肠, 费用自理。
6. 除上述, 本项检查在实施中/后可能发生其它并发症或者需要提醒患者注意的其它事项, 如:

目前的国际临床应用数据表明, 胶囊式内镜在小肠疾病的诊断率约在 70% 左右, 因此胶囊式内镜检查最后结果获得阴性结果或正常图像并不能排除疾病存在, 如果症状持续存在, 仍需进一步进行更多的检查。如果怀疑有肠痿或肠狭窄, 或是曾有过腹部或骨盆手术, 或是胃肠道肿瘤, 应及时告诉医师, 以在胶囊内镜检查前进行适当的预检。如检查完成时间少于 6 小时或在检查过程中出现异常情况, 患者应及时通知医师, 医师将尽力防治, 但有时仍难

以预料和完全避免。

依照有关法规, 作为患者拥有知情权和接受相关检查与否的权利。为此, 患者本人已仔细阅读《胶囊式内镜镜检查患者须知》, 充分了解本项检查之禁忌症及适应症, 充分理解本项检查之原理、注意事项及相关费用。患者在检查过程中医师可以根据患者的具体情况对检查治疗方式作出调整; 患者本人及家属理解其并未得到院方检查治疗百分之百成功的许诺; 患者同意需要时使用一次性物品并承担相关费用; 患者已经如实提供病史及既往检查资料, 如有隐瞒后果自负; 患者同意承担出现并发症时需要进一步诊治所发生的费用。

经治医师已进行全面说明和详细交代, 如果病人和/或家属对此能充分理解, 自愿在本院接受和配合检查, 请签本知情同意书。

患者本人或家属签名: [REDACTED]
日期: [REDACTED]

谈话医师签名: [REDACTED]
日期: [REDACTED]