



**SOUHLAS S PROVEDENÍM TRANSJUGULÁRNÍHO
PORTOSYSTÉMOVÉHO ZKRATU (TIPS)**

Údaje o pacientovi:

Jméno a příjmení

R.č.:

Váha **Výška**

Pojišťovna:

Pro ženy - informace o těhotenství

Mám podezření na těhotenství ano ne

Jsem těhotná ano ne

U nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům vyplní zákonný zástupce pacienta nebo svědek, který byl přítomen projevu souhlasu.
(nemůže-li se pacient podepsat):

Jméno a příjmení: **R.č.:**

Bydliště:

Důvody, pro něž pacient nemohl souhlas podepsat:

Cíl, povaha a postup při TIPSu

TIPS se provádí u pacientů s tzv. portální hypertenzí, což znamená, že játra, většinou cirhotická, omezují průtok tzv. portální žilou (česky vrátnice). Důsledkem tohoto stavu jsou buď krvácející jícnové městky (varixy) nebo neustále se doplňující ascites (tekutina v břišní dutině). Cílem TIPSu je vytvořit umělý zkrat mezi portální žilou (vrátnicí) a jaterními žilami.

Postup výkonu

Výkon se provádí na angiografickém sále, v celkové narkóze, instrumentarium se zavádí z žíly na krku. Z tohoto přístupu je nalezena jaterní žíla, ze které vpichem přes jaterní tkáň punktujeme portální žílu a spojujeme obě řečiště zavedením kovové výztuže potažené syntetickou tkaninou (stentgraft). Výkon končí odstraněním instrumentária a buď ponecháním cévky na krku, nebo kompresí místa vpichu.

Rizika a komplikace při a po výkonu

Výkon je velmi technicky složitý a hlavním rizikem je krvácení z jaterní tkáně. Podle typu poškození jater se taková komplikace vyskytuje ve 2-5 %. Vzácnou komplikací je alergie na kontrastní látky, předem známá alergická anamnéza umožňuje přípravu pacienta antialergickou medikací. Poměrně vzácnou komplikací je ještě tzv. encefalopatie, která se projevuje určitou zmateností po výkonu, stav se většinou postupně upravuje. Výkon je prováděn pod rtg kontrolou a přináší radiační zátěž, která je aplikujícím odborníkem minimalizována na nejnižší možnou míru, v souladu s platnými předpisy. Pacientky žádáme o nahlášení případného těhotenství.

Omezení po provedeném výkonu

Po výkonu zůstává pacient do druhého dne ležet a dále nemá závažnější omezení.

Alternativní možnosti výkonu

Alternativou je chirurgické vytvoření zkratu mezi portálním a žilním řečištěm.

Doplňující otázky pacienta

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným způsobem informoval o provedení TIPSu, a to včetně upozornění na možné komplikace.

Lékař, který pacienta poučil

..... 26.3.2018
datum jméno podpis

Souhlas pacienta

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně seznámen(a) s veškerými shora uvedenými skutečnostmi včetně upozornění na možné komplikace.

Pacientka – potvrzuji, že nejsem těhotná. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl(a) jsem jim a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením TIPSu.

..... 26.3.2018
datum podpis pacienta
(zákonného zástupce, event. svědka)